

DMA Přednáška – Rekurentní rovnice

Definice.

Rekurentní rovnice či **rekurzivní rovnice** je vztah

$$a_{n+1} = G(a_n, a_{n-1}, \dots, a_{n-m}), \quad n \geq n_0 + m,$$

kde $n_0 \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}_0$ a G je nějaká funkce $m + 1$ proměnných.

Jejím **řešením** nazveme libovolnou posloupnost $\{a_n\}_{n=n_0}^{\infty}$ takovou, že pro každé $n \geq n_0 + m$ dostaneme po dosazení členů posloupnosti $a_{n-m}, a_{n-m+1}, \dots, a_n, a_{n+1}$ do dané rovnice pravdivý výrok.

Definice.

Lineární rekurentní rovnice, popřípadě **lineární rekursivní rovnice řádu** $k \in \mathbb{N}_0$ je libovolná rovnice ve tvaru

$$a_{n+k} + c_{k-1}(n)a_{n+k-1} + \dots + c_2(n)a_{n+2} + c_1(n)a_{n+1} + c_0(n)a_n = b_n, \quad n \geq n_0,$$

kde $n_0 \in \mathbb{Z}$, $c_i(n)$ pro $i = \{0, \dots, k-1\}$ (tzv. **koefficienty** rovnice) jsou nějaké funkce $\mathbb{Z} \mapsto \mathbb{R}$, přičemž $c_0(n)$ není identicky nulová funkce, a $\{b_n\}_{n=n_0}^{\infty}$ (tzv. **pravá strana rovnice**) je pevně zvolená posloupnost reálných čísel.

Jestliže $b_n = 0$ pro všechna $n \geq n_0$, pak se příslušná rovnice nazývá **homogenní**.

Zápis rovnice pomocí sumačního značení:

$$a_{n+k} + \sum_{i=0}^{k-1} c_i(n)a_{n+i} = b_n.$$

Definice.

Uvažujme lineární rekurentní rovnici

$$a_{n+k} + c_{k-1}(n)a_{n+k-1} + \dots + c_1(n)a_{n+1} + c_0(n)a_n = b_n, \quad n \geq n_0.$$

Pak se lineární rekurentní rovnice

$$a_{n+k} + c_{k-1}(n)a_{n+k-1} + \dots + c_1(n)a_{n+1} + c_0(n)a_n = 0, \quad n \geq n_0$$

nazývá k ní **přidružená homogenní rovnice**.

Věta. (o struktuře řešení lineární rekurentní rovnice)

Nechť je dána lineární rekurentní rovnice

$$a_{n+k} + c_{k-1}(n)a_{n+k-1} + \dots + c_1(n)a_{n+1} + c_0(n)a_n = b_n, \quad n \geq n_0$$

a nějaké její řešení $\{a_{p,n}\}_{n=n_0}^{\infty}$.

Posloupnost $\{a_n\}_{n=n_0}^{\infty}$ je řešením této rovnice právě tehdy, pokud se dá napsat jako $\{a_n\} = \{a_{p,n}\} + \{a_{h,n}\}$, kde $\{a_{h,n}\}_{n=n_0}^{\infty}$ je nějaké řešení přidružené homogenní rovnice.

Množina všech řešení dané lineární rekurentní rovnice je tedy

$$\{\{a_{p,n}\} + \{a_{h,n}\}; \{a_{h,n}\} \text{ řeší přidruženou homogenní rovnici}\}.$$

Věta. (o prostoru řešení homogenní lineární rekurentní rovnice)

Množina všech řešení dané homogenní lineární rekurentní rovnice řádu k je vektorový prostor dimenze k .

Definice.

Lineární rekurentní rovnice s konstantními koeficienty je libovolná rovnice ve tvaru

$$a_{n+k} + c_{k-1}a_{n+k-1} + \dots + c_1a_{n+1} + c_0a_n = b_n, \quad n \geq n_0,$$

kde $n_0 \in \mathbb{Z}$, $c_i \in \mathbb{R}$ pro $i = 0, \dots, k-1$ jsou pevně zvolená čísla a $\{b_n\}_{n=n_0}^{\infty}$ je pevně zvolená posloupnost reálných čísel.

Definice.

Nechť je dána lineární rekurentní rovnice s konstantními koeficienty

$$a_{n+k} + c_{k-1}a_{n+k-1} + \dots + c_1a_{n+1} + c_0a_n = b_n, \quad n \geq n_0.$$

Její **charakteristický polynom** je definován jako polynom

$$p(\lambda) = \lambda^k + c_{k-1}\lambda^{k-1} + \dots + c_1\lambda + c_0.$$

Kořeny charakteristického polynomu se nazývají **charakteristická čísla**, popřípadě **vlastní čísla** dané rovnice. Řešené rovnici

$$\lambda^k + c_{k-1}\lambda^{k-1} + \dots + c_1\lambda + c_0 = 0$$

se také říká **charakteristická rovnice**.

Fakt.

Jestliže je λ_0 charakteristickým číslem dané homogenní lineární rekurentní rovnice s konstantními koeficienty, pak je posloupnost $\{\lambda_0^n\}_{n=n_0}^\infty$ jejím řešením.

Věta.

Uvažujme homogenní lineární rekurentní rovnici s konstantními koeficienty. Jestliže jsou λ_i různá její charakteristická čísla, pak $\{\lambda_i^n\}_{n=n_0}^\infty$ tvoří lineárně nezávislou množinu řešení této rovnice.

Definice.

Nechť je dána lineární rekurentní rovnice řádu k

$$a_{n+k} + c_{k-1}(n)a_{n+k-1} + \dots + c_1(n)a_{n+1} + c_0(n)a_n = b_n, \quad n \geq n_0.$$

Za **počáteční podmínky (initial conditions)** pro tuto rovnici považujeme libovolnou soustavu rovnic $a_{n_0} = A_0$, $a_{n_0+1} = A_1, \dots, a_{n_0+k-1} = A_{k-1}$, kde $A_i \in \mathbb{R}$ jsou pevně zvolená čísla.

Fakt.

Nechť je dána homogenní lineární rekurentní rovnice s konstantními koeficienty. Jestliže je λ_0 její charakteristické číslo a má násobnost m jako kořen charakteristického polynomu, pak posloupnosti $\{\lambda_0^n\}, \{n\lambda_0^n\}, \dots, \{n^{m-1}\lambda_0^n\}$ jsou řešení dané rovnice a tvoří lineárně nezávislou množinu.

Věta.

Nechť je dána homogenní lineární rekurentní rovnice s konstantními koeficienty řádu k . Nechť jsou $\lambda_1, \dots, \lambda_M$ její různá charakteristická čísla, přičemž každé λ_i má násobnost $m_i \in \mathbb{N}$. Pak je množina

$$\{\{\lambda_1^n\}, \{n\lambda_1^n\}, \dots, \{n^{m_1-1}\lambda_1^n\}, \{\lambda_2^n\}, \{n\lambda_2^n\}, \dots, \{n^{m_2-1}\lambda_2^n\}, \dots, \{\lambda_M^n\}, \{n\lambda_M^n\}, \dots, \{n^{m_M-1}\lambda_M^n\}\}$$

bází prostoru řešení dané rovnice.

Algoritmus pro řešení homogenní lineární rekurentní rovnice $a_{n+k} + \sum_{i=0}^{k-1} c_i a_{n+i} = 0$, $n \geq n_0$, řádu k .

1. Sestavte charakteristický polynom $p(\lambda) = \lambda^k + \sum_{i=0}^{k-1} c_i \lambda^i$.

Řešením rovnice $p(\lambda) = 0$ najdete všechna charakteristická čísla dané rovnice.

2. Sestavte množinu posloupností B takto:

- pro každé reálné charakteristické číslo λ přidejte do B posloupnost $\{\lambda^n\}_{n=n_0}^\infty$;
 - pro každé reálné charakteristické číslo λ , jehož násobnost je $m > 1$, přidejte do B rovněž posloupnosti $\{n\lambda^n\}_{n=n_0}^\infty, \dots, \{n^{m-1}\lambda^n\}_{n=n_0}^\infty$;
 - pro každé komplexní charakteristické číslo $\lambda = r[\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)]$, které není reálné, přidejte do B posloupnosti $\{r^n \cos(n\varphi)\}_{n=n_0}^\infty$ a $\{r^n \sin(n\varphi)\}_{n=n_0}^\infty$; pro jeho komplexně sdružené číslo λ^* již do B nic nepřidáváme;
 - pro každé komplexní charakteristické číslo $\lambda = r[\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)]$, které není reálné a jehož násobnost je $m > 1$, přidejte do B posloupnosti $\{nr^n \cos(n\varphi)\}_{n=n_0}^\infty, \dots, \{n^{m-1}r^n \cos(n\varphi)\}_{n=n_0}^\infty$ a $\{nr^n \sin(n\varphi)\}_{n=n_0}^\infty, \dots, \{n^{m-1}r^n \sin(n\varphi)\}_{n=n_0}^\infty$; pro jeho komplexně sdružené číslo λ^* již do B nic nepřidáváme.
- Množina B je báze prostoru řešení.

3. Označíme-li $B = \{\{a_{1,n}\}, \dots, \{a_{k,n}\}\}$, pak je obecné řešení dané rovnice určeno vzorcem $\left\{ \sum_{i=1}^k u_i a_{i,n} \right\}_{n=n_0}^\infty$ pro $u_1, \dots, u_k \in \mathbb{R}$.

4. Jsou-li dány počáteční podmínky, pak do nich za příslušná a_j pro $j = n_0, \dots, n_0 + k - 1$ dosadíme vzorce $a_j = \sum_{i=1}^k u_i a_{i,j}$ a vyřešíme vzniklých k rovnic pro k neznámých u_i . Ty po dosazení do obecného řešení určí příslušné partikulární řešení.

Definice.

Řekneme, že posloupnost $\{b_n\}_{n=n_0}^{\infty}$ je **kvazipolynom**, jestliže existuje $\lambda \in \mathbb{R}$ a polynom $P(n)$ takový, že $b_n = P(n)\lambda^n$ pro všechna $n \geq n_0$.

Věta.

Uvažujme rovnici

$$a_{n+k} + c_{k-1}a_{n+k-1} + \cdots + c_1a_{n+1} + c_0a_n = b_n, \quad n \geq n_0.$$

Předpokládejme, že existují $\lambda \in \mathbb{R}$ a polynom P takový, že $b_n = P(n)\lambda^n$ pro všechna $n \geq n_0$. Nechť m je násobnost tohoto čísla λ jako charakteristického čísla přidružené homogenní rovnice, přičemž $m = 0$ v případě, že toto λ vůbec charakteristickým číslem není.

Pak existuje polynom $Q(n)$ stupně stejného jako P takový, že $\{n^m Q(n)\lambda^n\}$ je řešením dané rovnice.

$a_{n+2} - 9a_n =$ [$\lambda = -3, 3$]	$a_{n+2} - 3a_{n+1} + 2a_n =$ [$\lambda = 1, 2$]	$a_{n+2} - 4a_{n+1} + 4a_n =$ [$\lambda = 2$ ($2\times$)]	$L = / = b_n$
			$= n 2^n$ [$\lambda = 2$]
			$= n^2(-1)^n$ [$\lambda = -1$]
			$= 2n - 5$ [$\lambda = 1$]
			$= (-3)^n$ [$\lambda = -3$]

Algoritmus pro nalezení řešení rovnice $a_{n+k} + c_{k-1}a_{n+k-1} + \dots + c_1a_{n+1} + c_0a_n = b_n$, $n \geq n_0$, kde $b_n = P(n)\lambda^n$, $c_i \in \mathbb{R}$ a $c_0 \neq 0$ (tedy řád k).

1. Nejprve řešte přidruženou homogenní rovnici $a_{n+k} + c_{k-1}a_{n+k-1} + \dots + c_1a_{n+1} + c_0a_n = 0$.

a) Najděte všechna charakteristická čísla λ_j s násobnostmi m_j řešením rovnice $\lambda^k + c_{k-1}\lambda^{k-1} + \dots + c_1\lambda + c_0 = 0$.

b) Sestavte bázi prostoru řešení $B = \{ \{a_{i,n}\}_{n=n_0}^\infty; i = 1, \dots, k \}$.

c) Obecné řešení přidružené homogenní rovnice je $\{a_{h,n}\} = \left\{ \sum_{i=1}^k u_i a_{i,n} \right\}$ pro $u_i \in \mathbb{R}$.

Pokud byla zadaná rovnice již homogenní, jděte na **3**.

2. Pokud nebyla zadaná rovnice homogenní, zkontrolujte, že je pravá strana kvazipolynom, tedy $b_n = P(n)\lambda^n$ pro nějaké $\lambda \in \mathbb{R}$ a polynom P .

a) Porovnejte λ s charakteristickými čísly λ_j z kroku **1**. Pokud se žádnému nerovná, položte $m = 0$. Pokud pro nějaké j platí $\lambda = \lambda_j$, položte $m = m_j$ (násobnost dotýčného charakteristického čísla).

b) Sestavte obecný polynom Q stupně stejného jako P , tradičně se používá $Q(n) = A + Bn + \dots$.

c) Uhádněte řešení $a_n = n^m Q(n)\lambda^n$. Dosaďte jej do dané rovnice a po zkrácení λ zjednodušte levou stranu do tvaru polynomu. Porovnáním koeficientů polynomů na levé a pravé straně získáte tolik rovnic, kolik je neznámých koeficientů v Q .

d) Vyřešte tyto rovnice a obdržené konstanty dosaďte zpět do Q . Získáte jedno konkrétní řešení $a_{p,n}$.

e) Obecné řešení dané úlohy je $\left\{ a_{p,n} + \sum_{i=1}^k u_i a_{i,n} \right\}_{n=n_0}^\infty$ či $a_n = a_{p,n} + \sum_{i=1}^k u_i a_{i,n}$ pro $n \geq n_0$.

3. Pokud byly s rovnicí zadány také počáteční podmínky, dosaďte za a_j v těchto podmínkách vzorce pro a_j z obecného řešení, které jste našli. Získáte k rovnic pro k neznámých u_1, \dots, u_k . Vyřešte tuto soustavu, získaná u_i dosaďte do vzorce pro obecné řešení a dostanete tak partikulární řešení pro zadanou úlohu.

Věta.

Nechť $k \in \mathbb{N}$, uvažujme funkce $c_0(n), c_1(n), \dots, c_{k-1}(n): \mathbb{Z} \mapsto \mathbb{R}$.

Jestliže posloupnost $\{a_n\}_{n=n_0}^{\infty}$ řeší rovnici $a_{n+k} + \sum_{i=0}^{k-1} c_i(n)a_{n+i} = b_n, \quad n \geq n_0$

a posloupnost $\{\tilde{a}_n\}_{n=n_0}^{\infty}$ řeší rovnici $a_{n+k} + \sum_{i=0}^{k-1} c_i(n)a_{n+i} = \tilde{b}_n, \quad n \geq n_0,$

pak posloupnost $\{a_n + \tilde{a}_n\}_{n=n_0}^{\infty}$ řeší rovnici $a_{n+k} + \sum_{i=0}^{k-1} c_i(n)a_{n+i} = b_n + \tilde{b}_n \quad \text{pro všechna } n \geq n_0.$

Fakt.

Nechť je funkce f na \mathbb{N} dána vzorcem $f(n) = a \cdot f\left(\frac{n}{b}\right)$ pro $a > 0$ a $b \in \mathbb{N}$, $b \geq 2$.

Pak pro $n \in \{b^k; k \in \mathbb{N}\}$ platí $f(n) = n^{\log_b(a)} f(1)$.

Věta. (The Master theorem)

Uvažujme neklesající nezápornou funkci f na \mathbb{N} . Pro nějaké $b \in \mathbb{N}$, $b \geq 2$ označme $M = \{b^k; k \in \mathbb{N}\}$ a předpokládejme, že f splňuje na M rovnici $f(n) = a \cdot f\left(\frac{n}{b}\right) + cn^d$ pro konstanty $a, c \in \mathbb{R}$, $d \in \mathbb{N}_0$ splňující $a \geq 1$ a $c > 0$. Pak platí následující:

- (i) Jestliže $a > b^d$, tak $f(n) = \Theta(n^{\log_b(a)})$.
- (ii) Jestliže $a = b^d$, tak $f(n) = \Theta(n^d \log_2(n))$.
- (iii) Jestliže $a < b^d$, tak $f(n) = \Theta(n^d)$.

Důsledek.

Uvažujme neklesající nezápornou funkci f na \mathbb{N} . Pro nějaké $b \in \mathbb{N}$, $b \geq 2$ označme $M = \{b^k; k \in \mathbb{N}\}$ a předpokládejme, že f splňuje na M rovnici $f(n) = a \cdot f\left(\frac{n}{b}\right) + cn^d$ pro konstanty $a, c \in \mathbb{R}$, $d \in \mathbb{N}_0$ splňující $a \geq 1$ a $c \geq 0$. Pak platí následující:

- (i) Jestliže $d < \log_b(a)$ nebo $c = 0$, tak $f(n)$ je $\Theta(n^{\log_b(a)})$.
- (ii) Jestliže $d = \log_b(a)$, tak $f(n)$ je $\Theta(n^{\log_b(a)} \log_2(n)) = \Theta(n^d \log_2(n))$.
- (iii) Jestliže $d > \log_b(a)$, tak $f(n)$ je $\Theta(n^d)$.

x, y : čísla o $n = 2m$ cifrách.

Nechť $x = x_L \cdot 10^m + x_R$, $y = y_L \cdot 10^m + y_R$. Pak

$$\begin{aligned}xy &= (x_L \cdot 10^m + x_R)(y_L \cdot 10^m + y_R) \\ &= 10^{2m}x_Ly_L + 10^m(x_Ly_R + x_Ry_L) + x_Ry_R.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}xy &= (x_L \cdot 10^m + x_R)(y_L \cdot 10^m + y_R) \\ &= 10^{2m}x_Ly_L + 10^m(x_Ly_R + x_Ry_L) + x_Ry_R \\ &= 10^{2m}x_Ly_L + 10^m[x_Ly_L + (x_L - x_R)(y_R - y_L) + x_Ry_R] + x_Ry_R.\end{aligned}$$