

10. cvičení z PST

5. prosince 2018

10.1 (intervalový odhad pro rozptyl)

Soubor (70, 84, 89, 70, 74, 70) je náhodným výběrem z normálního rozdělení $N(\mu, \sigma^2)$. Určete oboustranný symetrický 95% interval spolehlivosti pro rozptyl σ^2 .

Řešení:

Interval spolehlivosti pro rozptyl určíme ze statistiky

$$T = \frac{(n-1) S_{\mathbf{X}}^2}{\sigma^2},$$

má rozdělení $\chi^2(n-1)$, kde $n = 6$ je rozsah výběru a $S_{\mathbf{X}}^2$ je výběrový rozptyl. Oboustranný symetrický $1 - \alpha = 95\%$ interval spolehlivosti pro realizaci t veličiny T je

$$q_{\chi^2(n-1)}\left(\frac{\alpha}{2}\right) \leq \frac{(n-1) s_{\mathbf{x}}^2}{\sigma^2} \leq q_{\chi^2(n-1)}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right).$$

Po úpravě máme

$$\frac{(n-1) s_{\mathbf{x}}^2}{q_{\chi^2(n-1)}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1) s_{\mathbf{x}}^2}{q_{\chi^2(n-1)}\left(\frac{\alpha}{2}\right)}.$$

Realizace výběrového průměru a rozptylu jsou

$$\bar{x} = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 x_i = \frac{457}{6} \doteq 76.17$$

$$s_{\mathbf{x}}^2 = \frac{1}{5} \left(\sum_{i=1}^6 x_i^2 - 6 \cdot (\bar{x})^2 \right) \doteq \frac{341.787}{5} \doteq 68.358$$

a příslušné kvantily jsou

$$q_{\chi^2(5)}(0.025) = 0.831$$

$$q_{\chi^2(5)}(0.975) = 12.83.$$

Po dosazení dostáváme hledaný interval

$$26.64 \doteq \frac{341.787}{12.83} \leq \sigma^2 \leq \frac{341.787}{0.831} \doteq 411.296.$$

10.2 (intervalový odhad pro rozptyl)

Deset opakovaných měření obsahu alkoholu ve vzorku krve má průměrnou hodnotu $\bar{x} = 0.15$ promile (alkoholu v krvi) a směrodatnou odchylku $s_{\mathbf{x}} = 0.01$ promile (alkoholu v krvi). Jakou hodnotu σ_0 překročí chyba metody (t.j. směrodatná odchylka) s pravděpodobností nejvýše $\alpha = 1\%$? Uveďte použité předpoklady.

Řešení:

U veličiny

$Y = \text{“naměřený obsah alkoholu v krvi (v promilích)”}$

budeme předpokládat normální rozdělení $N(\mu, \sigma^2)$. Naše veličina

$X = \text{“chyba měření obsahu alkoholu v krvi (v promilích)”}$

bude tedy určena jako $X = Y - \mu$ s rozdělením $N(0, \sigma^2)$. Jednotlivá měření považujeme za nezávislá. Hledáme horní $1 - \alpha = 99\%$ intervalový odhad pro parametr rozptylu σ^2 , který bude tvaru $(0, \sigma_0^2)$.

Pro statistiku

$$T = \frac{(n-1) S_{\mathbf{X}}^2}{\sigma^2}$$

s χ^2 -rozdělením s $n - 1 = 9$ stupni volnosti máme, že **dolní** $1 - \alpha = 99\%$ interval spolehlivosti pro **realizaci** t veličiny T je:

$$q_{\chi^2(n-1)}(\alpha) \leq t = \frac{(n-1) s_x^2}{\sigma^2}$$

takže

$$\sigma^2 \leq \frac{(n-1) s_x^2}{q_{\chi^2(n-1)}(\alpha)} =: \sigma_0^2$$

a hledaná hranice tak je

$$\sigma_0 = s_x \cdot \sqrt{\frac{n-1}{q_{\chi^2(n-1)}(\alpha)}} = 0.01 \cdot \sqrt{\frac{9}{q_{\chi^2(9)}(0.01)}} \doteq \frac{0.03}{\sqrt{2.0879}} \doteq 0.02076.$$

10.3 (metoda momentů a max. věrohodnosti - diskrétní rozdělení)

Odhadněte parametr $w \in (0, 1)$ veličiny X s geometrickým rozdělením

$$p_X(i; w) = w^i(1 - w), \quad i \in \mathbb{N}_0$$

na základě realizace s následujícími četnostmi výsledků:

hodnota i	0	1	2	3
pozorovaná četnost n_i	20	10	7	3

Použijte metodu momentů i metodu maximální věrohodnosti.

Řešení:

Součet pravděpodobností všech hodnot je 1.

Metoda maximální věrohodnosti:

Hledáme hodnotu w , která maximalizuje funkci věrohodnosti

$$\begin{aligned} L(w) &= P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n; w) = \prod_{j=1}^n \underbrace{P(X_j = x_j; w)}_{p_X(x_j; w)} = \prod_{i=0}^3 p_X(i; w)^{n_i} = \\ &= (1 - w)^{20} (w(1 - w))^{10} (w^2(1 - w))^7 (w^3(1 - w))^3 = w^{33}(1 - w)^{40} \end{aligned}$$

kde X_j jsou jednotlivé nezávislé veličiny (odpovídající jednotlivým pokusům) a x_j naměřené hodnoty. Funkce L je nezáporná a spojitá na uzavřené množině $(0, 1)$, takže zde nabývá maxima. To nemůže být v krajních bodech (tam je funkce nulová) a proto je nabyto uvnitř dané množiny. To tedy odpovídá hledání maxima funkce

$$\ell(w) = \ln(L(w)) = 33 \cdot \ln(w) + 40 \cdot \ln(1 - w)$$

na otevřeném intervalu $(0, 1)$. Protože maximum existuje, musí pro něj platit

$$0 = \ell'(w) = \frac{33}{w} - \frac{40}{1 - w}$$

neboli

$$w = \frac{33}{73} \doteq 0.45205$$

což vyhovuje zadání.

Metoda momentů:

Porovnáváme teoretické k -té momenty $E(X^k)$ s jejich odhady $m_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k$ pro prvních několik $k = 1, 2, \dots$

Střední hodnota je

$$E(X) = \sum_{i=0}^{\infty} i w^i (1 - w) = \sum_{i=1}^{\infty} i w^i - \sum_{i=1}^{\infty} i w^{i+1} = \sum_{i=1}^{\infty} i w^i - \sum_{i=2}^{\infty} (i - 1) w^i =$$

$$= w + \sum_{i=2}^{\infty} (i - i + 1)w^i = \sum_{i=1}^{\infty} w^i = w \sum_{i=1}^{\infty} w^{i-1} = \frac{w}{1 - w}$$

a její odhad z realizace je

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_i i n_i = \frac{1}{20 + 10 + 7 + 3} \cdot (0 \cdot 20 + 1 \cdot 10 + 2 \cdot 7 + 3 \cdot 3) = \frac{33}{40}.$$

Porovnáním dostaneme

$$\frac{w}{1 - w} = E(X) = \bar{x} = \frac{33}{40}$$

což dává opět řešení

$$w = \frac{33}{73} \doteq 0.45205$$

jako v předchozí metodě.

Jak je snadno vidět, v případě geometrického rozdělení dostáváme pro jeho parametr w vždy stejné výsledky pro obě metody.

10.4 (metoda momentů a max. věrohodnosti - diskretní rozdělení)

Náhodná veličina X nabývá hodnot s pravděpodobnostmi dle tabulky, kde c, q jsou reálné parametry rozdělení. Z četností hodnot v náhodném výběru, uvedených v tabulce, odhadněte parametry c a q .

hodnota i	1	2	3
pravděpodobnost $p_X(i; c, q)$	$c - q$	c	$c + q$
četnost n_i	8	10	5

Řešení:

Protože součet pravděpodobností všech hodnot je 1, musí být

$$1 = (c - q) + c + (c + q) = 3c$$

tedy $c = \frac{1}{3}$. Současně musí být pravděpodobnosti nezáporné, tj. $0 \leq c - q = \frac{1}{3} - q$ a $0 \leq c + q = \frac{1}{3} + q$, takže $|q| \leq \frac{1}{3}$. Zbývá tedy odhadnout parametr q .

Metoda maximální věrohodnosti:

Hledáme hodnotu q , která maximalizuje funkci věrohodnosti

$$L(q) = P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n; \frac{1}{3}, q) = \prod_{j=1}^n \underbrace{P(X_j = x_j; \frac{1}{3}, q)}_{p_X(x_j; \frac{1}{3}, q)} = \left(\frac{1}{3} - q\right)^8 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{10} \cdot \left(\frac{1}{3} + q\right)^5$$

kde X_j jsou jednotlivé nezávislé veličiny (v pokusech) a x_j naměřené hodnoty. Funkce L je nezáporná a spojitá na uzavřené množině $\langle -\frac{1}{3}, \frac{1}{3} \rangle$, takže zde nabývá maxima. To nemůže být v krajních bodech (tam je nulová) a proto je nabyto uvnitř dané množiny. To odpovídá hledání maxima funkce

$$\ell(q) = \ln(L(q)) = 8 \cdot \ln\left(\frac{1}{3} - q\right) + 5 \cdot \ln\left(\frac{1}{3} + q\right) + konst.$$

na intervalu $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$. Protože maximum existuje, musí pro něj platit

$$0 = \ell'(q) = \frac{-8}{\frac{1}{3} - q} + \frac{5}{\frac{1}{3} + q}$$

Odhad parametru q je

$$q = -\frac{1}{13} \doteq -0.07692.$$

Odhady pravděpodobností hodnot 1, 2, 3 jsou tedy

$$p_X(1) = \frac{16}{39} \doteq 0.4103 \quad p_X(2) = \frac{1}{3} \doteq 0.3333 \quad p_X(3) = \frac{10}{39} \doteq 0.2564$$

což vyhovuje zadání.

Metoda momentů:

Střední hodnota je

$$E(X) = \left(\frac{1}{3} - q\right) + 2 \cdot \frac{1}{3} + 3 \cdot \left(\frac{1}{3} + q\right) = 2 + 2q$$

její odhad z realizace je

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_i i n_i = \frac{1}{8+10+5} \cdot (1 \cdot 8 + 2 \cdot 10 + 3 \cdot 5) = \frac{43}{23}.$$

Porovnáním dostaneme

$$2 + 2q = E(X) = \bar{x} = \frac{43}{23}$$

což odpovídá hodnotě

$$q = -\frac{3}{46} \doteq -0.06522.$$

Odhady pravděpodobností hodnot 1, 2, 3 jsou tedy

$$p_X(1) = \frac{55}{138} \doteq 0.3986 \quad p_X(2) = \frac{1}{3} \doteq 0.3333 \quad p_X(3) = \frac{37}{138} \doteq 0.2681$$

což opět vyhovuje zadání.

10.5 (metoda momentů a max. věrohodnosti - směs)

V urně je mnoho hracích kostek, z nichž některé jsou správné, některé falešné. Na falešných padá šestka s pravděpodobností $1/2$, zbývající čísla mají stejnou pravděpodobnost. Opakovaně jsme vytáhli kostku, hodili ji a vrátili ji zpět. Četnost výsledků udává tabulka:

hodnota i	1	2	3	4	5	6
četnost n_i	18	20	12	15	10	25

Odhadněte, kolik procent kostek je falešných.

Řešení:

Podíl falešných kostek označme $c \in (0, 1)$. Naše náhodná veličina je

$$X = \text{“hodnota, která padne na dané kostce”}$$

a můžeme ji vyjádřit jako směs $X = \text{Mix}_c(X_1, X_2)$ složenou z náhodných veličin

$$X_1 = \text{“hodnota, která padne na falešné kostce”}$$

$$X_1 : \text{“množina falešných kostek”} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$X_2 = \text{“hodnota, která padne na správné kostce”}$$

$$X_2 : \text{“množina správných kostek”} \rightarrow \mathbb{R}.$$

Metoda momentů: Máme

$$E(X_1) = \frac{1}{10}(1 + \dots + 5) + \frac{1}{2} \cdot 6 = \frac{9}{2}$$

a

$$E(X_2) = \frac{1}{6}(1 + \dots + 6) = \frac{7}{2}$$

a z definice směsi tak dostaneme

$$E(X) = c \cdot E(X_1) + (1 - c) \cdot E(X_2) = c \cdot \frac{9}{2} + (1 - c) \cdot \frac{7}{2} = c + \frac{7}{2}.$$

Realizace výběrového průměru je

$$\bar{x} = \frac{\sum_i n_i \cdot i}{\sum_i n_i} = \frac{18 \cdot 1 + 20 \cdot 2 + 12 \cdot 3 + 15 \cdot 4 + 10 \cdot 5 + 25 \cdot 6}{18 + 20 + 12 + 15 + 10 + 25} = \frac{354}{100} = 3.54.$$

Srovnáním dostaneme

$$\hat{p} + 3.5 = E(X) = \bar{x} = 3.54,$$

což dává $\hat{p} = 0.04 \in (0, 1)$, a to vyhovuje zadání.

Metoda maximální věrohodnosti:

Z definice směsi máme pro její pravděpodobnostní funkci, že

$$p_X(i) = c \cdot p_{X_1}(i) + (1-c) \cdot p_{X_2}(i) = \begin{cases} c \frac{1}{10} + (1-c) \frac{1}{6} = \frac{5-2c}{30} & , i = 1, \dots, 5, \\ c \frac{1}{2} + (1-c) \frac{1}{6} = \frac{1+2c}{6} & , i = 6. \end{cases}$$

Ve směsi rozdělení šestka padla $25 \times$, ostatní čísla padla $75 \times$ (není třeba mezi nimi rozlišovat, protože mají stejnou pravděpodobnost). Tedy věrohodnostní funkce je

$$L(c) = \left(\frac{5-2c}{30}\right)^{75} \cdot \left(\frac{1+2c}{6}\right)^{25},$$

$$\ell(c) = \ln(L(c)) = 75 \ln(5-2c) + 25 \ln(1+2c) + konst.$$

Maximum nastává pro \hat{c} takové, že

$$0 = \ell'(\hat{c}) = \frac{-150}{5-2\hat{c}} + \frac{50}{1+2\hat{c}} = 50 \cdot \frac{2-8\hat{c}}{(5-2\hat{c})(1+2\hat{c})},$$

$$\hat{c} = \frac{1}{4} \in (0, 1).$$

protože na intervalu $(0, \frac{1}{4})$ je $\ell' > 0$ a na $(\frac{1}{4}, 1)$ je $\ell' < 0$. Tato hodnota je i v souladu s počátečními omezujícími podmínkami.

10.6 (metoda momentů a max. věrohodnosti - směs)

Dvě diskrétní náhodné veličiny X, Y mají pravděpodobnostní funkce dané tabulkou. Odhadněte koeficient c směsi $Z = \text{Mix}_c(X, Y)$ z četností jejích realizací uvedených v tabulce.

hodnota	1	2	3	4
p_X	0.1	0.2	0.2	0.5
p_Y	0.5	0.2	0.2	0.1
četnost	30	20	15	35

Řešení:

Z definice směsi máme pro parametr c nutnou podmínku $0 \leq c \leq 1$.

Metoda momentů: Z definice směsi $Z = \text{Mix}_c(X, Y)$ dostaneme

$$E(Z) = c \cdot E(X) + (1-c) \cdot E(Y).$$

Pro střední hodnoty X a Y máme

$$E(X) = 0.1 + 2 \cdot 0.2 + 3 \cdot 0.2 + 4 \cdot 0.5 = 3.1$$

$$E(Y) = 0.5 + 2 \cdot 0.2 + 3 \cdot 0.2 + 4 \cdot 0.1 = 1.9.$$

Takže dostaneme

$$E(Z) = c \cdot E(X) + (1-c) \cdot E(Y) = 1.9 + 1.2 \cdot c.$$

Hodnota realizace výběrového průměru je

$$\bar{z} = \frac{30 + 2 \cdot 20 + 3 \cdot 15 + 4 \cdot 35}{100} = \frac{51}{20} = 2.55.$$

Jejich srovnáním dostáváme

$$1.9 + 1.2 \cdot c = E(Z) = \bar{z} = 2.55$$

takže výsledek je

$$c = \frac{13}{24} \doteq 0.5417.$$

Metoda maximální věrohodnosti: Z definice $Z = \text{Mix}_c(X, Y)$ pro pravděpodobnostní funkci dostaneme

$$p_Z = c \cdot p_X + (1-c) \cdot p_Y$$

hodnota	1	2	3	4
p_Z	$0.5 - 0.4c$	0.2	0.2	$0.1 + 0.4c$

Pro funkci věrohodnosti pak máme

$$L(c) = (0.5 - 0.4 \cdot c)^{30} \cdot 0.2^{20+15} \cdot (0.1 + 0.4 \cdot c)^{35}$$

Funkce L je nezáporná a spojitá na uzavřené množině $\langle 0, 1 \rangle$, takže zde nabývá maxima. To odpovídá hledání maxima funkce

$$\ell(c) = \ln L(c) = 30 \cdot \ln(0.5 - 0.4c) + 35 \cdot \ln(0.1 + 0.4c) + \text{konst.}$$

na stejném intervalu $\langle 0, 1 \rangle$. Poznamenejme, že tento interval je uvnitř většího definičního oboru daného podmínkami $0.5 - 0.4 \cdot c > 0$ a $0.1 + 0.4 \cdot c > 0$, tj. jde o otevřený interval $(-\frac{1}{4}, \frac{5}{4})$.

Derivace

$$0 = \ell'(\hat{c}) = -\frac{30 \cdot 0.4}{0.5 - 0.4\hat{c}} + \frac{35 \cdot 0.4}{0.1 + 0.4\hat{c}} = \frac{5.8 - 10.4\hat{c}}{(0.5 - 0.4\hat{c})(0.1 + 0.4\hat{c})}$$

je nulová ve stacionárním bodě

$$\hat{c} = \frac{29}{52} \doteq 0.5577.$$

V intervalu $(-\frac{1}{4}, \hat{c})$ je ℓ' evidentně kladná (o znaménku rozhoduje jen výraz v čitateli, výraz ve jmenovateli je kladný) a v intervalu $(\hat{c}, \frac{5}{4})$ je ℓ' zase záporná. Takže v bodě $\hat{c} = \frac{29}{52} \doteq 0.5577$ je skutečně věrohodnost maximální.

10.7 (metoda momentů a max. věrohodnosti - spojitě rozdělení)

Datový soubor $\mathbf{x} = (-4, -3, -2, -1.5, 0.5, 1, 2.5, 3)$ je realizací náhodné veličiny X , která má spojitě rovnoměrné rozdělení v intervalu $\langle -h, h \rangle$. Metodou momentů a metodou maximální věrohodnosti určete odhad parametru h (a ověřte, zda odhad odpovídá zadání).

Řešení:

Rozsah souboru je $n = 8$. Realizované výsledky musí spadat do oboru hodnot, což je interval $\langle -h, h \rangle$. Tedy musí být $|x_i| \leq h$ pro všechna i , neboli musí platit, že

$$h \geq \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\} = 4.$$

Metoda maximální věrohodnosti:

V metodě max. věrohodnosti pro spojitě rozdělení nahrazujeme pravděpodobnostní funkci p_X (která by zde byla vždy nulová) hustotou f_X , u které požadujeme, aby byla spojitá na oboru hodnot veličiny X (taková hustota už je pak jen jedna). Naše zadání toto splňuje, protože

$$f_X(x; h) = \begin{cases} \frac{1}{2h} & , |x| \leq h, \\ 0 & , |x| > h. \end{cases}$$

Naším cílem je maximalizovat funkci

$$\Lambda(h) = \prod_{i=1}^n \underbrace{f_{X_i}(x_i; h)}_{f_X(x_i; h)} = \left(\frac{1}{2h}\right)^n.$$

pro $h \in \langle 4, +\infty \rangle$. Tato funkce je klesající v proměnné h , takže nabývá maxima pro největší přípustnou hodnotu parametru

$$\hat{h} = 4.$$

Hledaný interval $\langle -h, h \rangle$ je tedy nejmenší takový, který obsahuje všechna x_i , pro $i = 1, \dots, n$.

Metoda momentů:

Opět porovnáváme teoretické k -té momenty $E(X^k)$ s jejich odhady $m_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k$ pro prvních několik $k = 1, 2, \dots$.

Protože hustota f_X je sudá, bude $E(X^k) = 0$ pro k liché. Speciálně, střední hodnota je $E(X) = 0$ a tedy požadavek $0 = E(X) = \bar{x}$ nám žádnou podmínku pro h nedává. Dokonce tuto rovnost ani není možno pro naše zadání splnit, protože:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = -\frac{3.5}{8} = -0.4375 \neq 0.$$

To nám ale nemusí vadit, protože jen těžko můžeme očekávat, že se aritmetickým průměrem při konečném počtu měření trefíme právě do hodnoty nula.

Proto musíme použít další momenty

$$E(X^2) = \int_{-h}^h x^2 \cdot \frac{1}{2h} dx = \left[\frac{x^3}{6h} \right]_{-h}^h = \frac{h^2}{3}.$$

Odhad druhého momentu je

$$m_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 = \frac{47.75}{8} = 5.96875.$$

Odhad parametru získáme jako řešení rovnice

$$\frac{\hat{h}^2}{3} = E(X^2) = m_2 = \frac{47.75}{8} \implies \hat{h} = \sqrt{17.90625} \doteq 4.2316.$$

Protože všechny hodnoty ze souboru leží v intervalu $\langle -h, h \rangle = \langle -4.2316, 4.2316 \rangle$, můžeme nalezenou hodnotu h tudíž považovat za hledaný odhad parametru rozdělení.

10.8 (metoda momentů a max. věrohodnosti - spojité rozdělení)

Náhodná veličina X s oborem hodnot $\langle a, +\infty \rangle$ má hustotu

$$f_X(t) = \begin{cases} 0 & , t \in (-\infty, a), \\ e^{a-t} & , t \in \langle a, \infty \rangle, \end{cases}$$

kde $a \in \mathbb{R}$ je parametr. Pomocí metody maximální věrohodnosti i metody momentů odhadněte parametr a .

Úlohu vyřešte obecně pro realizaci $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ a také pro konkrétní realizaci

$$\mathbf{x} = (1, 2, 2, 2, 3, 3, 4)$$

rozsahu $n = 7$.

Řešení:

Realizované výsledky musí spadat do oboru hodnot, tj.

$$x_i \in \langle a, +\infty \rangle$$

pro všechna $i = 1, \dots, n$ neboli musí platit, že

$$a \leq \min\{x_1, \dots, x_n\}.$$

Dále si všimněme, že funkce f_X je posunutá hustota exponenciálního rozdělení s parametrem $\tau = 1$ (neboli veličina $Y = X - a$ má exponenciální rozdělení $\text{Exp}(1)$, což se snadno odvodí). Tedy je to opět hustota. Ale to, že f_X je hustota můžeme ukázat i přímo: funkce f_X je nezáporná a platí, že

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(t) dt = \int_a^{\infty} e^{a-t} dt = e^a [-e^{-t}]_{t=a}^{t=\infty} = e^a \cdot e^{-a} = 1.$$

Metoda maximální věrohodnosti:

Metoda max. věrohodnosti pro spojité rozdělení je podobná jako pro diskrétní rozdělení. Pravděpodobnostní funkci zde nahradíme hustotou, která ale (jak víme) není jednoznačně definována. Aby tedy metoda měla vůbec smysl, uvažuje se zde jen případ, kdy hustota f_X je spojitá na oboru hodnot veličiny X (taková hustota už je pak jen jedna). Naše zadání toto splňuje.

Naším cílem je maximalizovat funkci

$$\Lambda(a) = \prod_{i=1}^n \underbrace{f_{X_i}(x_i; a)}_{f_X(x_i)} = \prod_{i=1}^n e^{a-x_i} = e^{n \cdot a} \cdot e^{-\sum_{i=1}^n x_i}.$$

pro $a \in (-\infty, \min\{x_1, \dots, x_n\})$. Tato funkce je rostoucí v proměnné a , takže nabývá maxima pro největší přípustnou hodnotu parametru

$$\hat{a} = \min\{x_1, \dots, x_n\}.$$

Pro konkrétní zadání je to pak

$$\hat{a} = \min\{1, 2, 2, 2, 3, 3, 4\} = 1 .$$

Metoda momentů:

Porovnáme teoretickou střední hodnotu

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} t \cdot f_X(t) dt = \int_a^{\infty} t e^{a-t} dt = [-t e^{a-t}]_{t=a}^{\infty} + \int_a^{\infty} e^{a-t} dt = \\ &= a + [-e^{a-t}]_{t=a}^{\infty} = a + 1 \end{aligned}$$

a výběrový průměr \bar{x} . Odtud tak pro parametr \hat{a} dostaneme

$$\hat{a} = \bar{x} - 1 ,$$

POKUD je ovšem splněno, že $a \leq \min\{x_1, \dots, x_n\}$!

Pro konkrétní zadání je $\bar{x} = \frac{1+2+2+2+3+3+4}{7} = \frac{17}{7}$ a tedy $\hat{a} = \frac{17}{7} - 1 \doteq 1.43$, což ale **NENÍ** menší než $\min\{1, 2, 2, 2, 3, 3, 4\} = 1$. V tomto případě tedy metoda momentů **NEDÁVÁ** žádný odhad.