

## 12. cvičení z PST

6. - 10. prosince 2021

**12.1** (test střední hodnoty dvou normálních rozdělání se stejným neznámým rozptylem)

Ve dvou obchodech prodávají stejný druh výrobku (balení mouky). Chceme si ověřit, že v obou obchodech váží balení v průměru stejně. Nakoupili jsme proto určité počty balení ( $m$  v prvním a  $n$  v druhém obchodě) a zvážili je (veličiny  $X$  je hmotnost balení v prvním a  $Y$  je hmotnost ve druhém obchodě). Obdrželi jsme tyto realizace odhadů:

$X$	$Y$
$m = 11$	$n = 21$
$\bar{x} = 1.0$ kg	$\bar{y} = 1.2$ kg,
$s_x = 0.2$ kg	$s_y = 0.3$ kg

Na hladině významnosti  $\alpha = 0.05$

- (a) posuďte hypotézu, že rozptyly veličin  $X$  a  $Y$  jsou stejné.  
(b) za předpokladu platnosti podmínky dle (a) posuďte hypotézu, že střední hodnoty veličin  $X$  a  $Y$  jsou stejné.

### Řešení:

Předpokládáme, že veličiny  $X$  a  $Y$  jsou *nezávislé* s normálními rozděláními po řadě  $N(\mu_1, \sigma_1^2)$  s  $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ . Jednotlivá měření  $X_1, \dots, X_m, Y_1, \dots, Y_n$  považujeme *všechna navzájem za nezávislá*.

(a) **Test stejného rozptylu:**

Budeme testovat nulovou hypotézu o rovnosti rozptylů

$$\mathbf{H}_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

proti alternativní hypotéze

$$\mathbf{H}_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 .$$

Testovací statistika je

$$T' = \frac{S_x^2}{S_y^2} ,$$

a má za předpokladu  $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$  tzv. Fisherovo-Snedecorovo  $F(m-1, n-1)$  - rozdělání s  $m-1$  a  $n-1$  stupni volnosti (v tomto pořadí!).

Za předpokladu nulové hypotézy  $\mathbf{H}_0$  je očekávaná hodnota statistiky  $T'$  rovna 1 a kritérium pro **ZAMÍTNUTÍ** tak (podobně jako v některých předchozích příkladech) bude tvaru

$$\mathbf{H}_0 \text{ zamítáme (na dané hladině } \alpha) \Leftrightarrow \left[ t' < q_{F(m-1, n-1)}\left(\frac{\alpha}{2}\right) \text{ nebo } q_{F(m-1, n-1)}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) < t' \right] .$$

Realizace testovací statistiky je

$$t' = \frac{s_x^2}{s_y^2} = \frac{0.04}{0.09} \doteq 0,444$$

a hodnoty kvantilů jsou

$$q_{F(m-1, n-1)}\left(\frac{\alpha}{2}\right) = q_{F(10, 20)}(0.025) = \frac{1}{q_{F(20, 10)}(0.975)} \doteq \frac{1}{3.42} \doteq 0.2924$$

a

$$q_{F(m-1, n-1)}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) = q_{F(10, 20)}(0.975) \doteq 2.77 .$$

Protože

$$t' \doteq 0.444 \in \langle 0.2924, 2.77 \rangle ,$$

hypotézu  $\mathbf{H}'_0$ , že  $X$  a  $Y$  mají stejný rozptyl, **NEZAMÍTÁME**.

(b) **Test rovnosti středních hodnot se stejným neznámým rozptylem:**

Předpokládáme  $\sigma_1 = \sigma_2$ . Tento předpoklad je podložen předchozím testem rovnosti rozptylů, který jsme nezamítli.

Budeme testovat nulovou hypotézu o rovnosti středních hodnot

$$\mathbf{H}_0 : \mu_1 = \mu_2$$

proti alternativní hypotéze

$$\mathbf{H}_1 : \mu_1 \neq \mu_2 .$$

Testovací statistika je

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S\sqrt{1/m + 1/n}} ,$$

kde

$$S^2 = \frac{m-1}{m+n-2} \cdot S_X^2 + \frac{n-1}{m+n-2} \cdot S_Y^2$$

je (vážený) odhad rozptylu. Za předpokladu nulové hypotézy  $\mathbf{H}_0$ , tj.  $\mu_1 = \mu_2$ , má statistika  $T$  Studentovo  $t(m+n-2)$ -rozdělení s  $m+n-2$  stupni volnosti.

Kritérium pro **ZAMÍTNUTÍ** bude proto (očekávatelně) tvaru

$$\mathbf{H}_0 \text{ zamítáme (na dané hladině } \alpha) \Leftrightarrow |t| > q_{t(m+n-2)}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) .$$

Po dosazení máme

$$s^2 = \frac{(m-1)s_x^2 + (n-1)s_y^2}{m+n-2} = \frac{10 \cdot (0.2)^2 + 20 \cdot (0.3)^2}{10+20} = \frac{0.22}{3}$$

a

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s\sqrt{1/m + 1/n}} = \frac{1 - 1.2}{\sqrt{\frac{0.22}{3}}\sqrt{\frac{1}{11} + \frac{1}{21}}} = -\frac{3}{4}\sqrt{7} \doteq -1.984 .$$

Hodnota kvantilu je

$$q_{t(m+n-2)}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) = q_{t(30)}(0.975) \doteq 2.042 .$$

Protože

$$|t| \doteq 1.984 \not> 2.042 \doteq q_{t(m+n-2)}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) ,$$

hypotézu  $\mathbf{H}_0$ , že  $X$  a  $Y$  mají stejnou střední hodnotu, také **NEZAMÍTÁME**.

## 12.2 (párový pokus)

U  $n = 8$  praváků jsme změřili délku prostředníčku na pravé a levé ruce, hodnoty v milimetrech uvádí tabulka.

Levá	81	74	90	84	77	67	59	70
Pravá	84	76	89	85	80	69	58	68

Na hladině významnosti  $\alpha = 5\%$  posuďte hypotézu, že praváci mají delší prostředníček na levé ruce, a uveďte předpoklady.

### Řešení:

Označme si veličiny

$X = \text{“délka prostředníčku na levé ruce”}$

$Y = \text{“délka prostředníčku na pravé ruce (u téhož člověka, zde navíc praváka)”}$ .

Pokud na jednom subjektu provádíme měření více veličin (zde  $X$  a  $Y$ ), pak už jejich vzájemné hodnoty nemůžeme považovat za nezávislé. Za nezávislá ovšem samozřejmě považujeme měření dvojice veličin  $(X, Y)$  (tj. náhodného vektoru) u různých lidí.

U veličiny  $\Delta := X - Y$ , která představuje rozdíly mezi veličinami můžeme přirozeně předpokládat normální rozdělení  $N(\mu, \sigma^2)$  (neboť jde o odchylky, které obvykle tuto vlastnost mají). Máme tedy nezávislá měření s hodnotami  $\delta = (x_1 - y_1, \dots, x_n - y_n)$  a naše původní hypotéza  $E(X) \geq E(Y)$  lze ekvivalentně vyjádřit pomocí  $0 \leq E(X) - E(Y) = E(\Delta) = \mu$  jako nulová hypotéza

$$\mathbf{H}_0 : \mu \geq 0$$

kterou otestujeme proti alternativní hypotéze

$$\mathbf{H}_1 : \mu < 0 .$$

na hladině významnosti  $\alpha = 5\%$ .

Půjde tedy o obvyklý test střední hodnoty (veličiny s normálním rozdělením) při neznámém rozptylu. Použijeme tudíž statistiku

$$T = \frac{\bar{\Delta}}{S_{\Delta}} \sqrt{n}$$

a kritérium pro **ZAMÍTNUTÍ** bude tvaru

$$\mathbf{H}_0 \text{ zamítáme (na dané hladině } \alpha) \Leftrightarrow t < q_{t(n-1)}(\alpha) .$$

Určíme si hodnoty realizace  $\delta$  veličiny  $\Delta = X - Y$

$x$	81	74	90	84	77	67	59	70
$y$	84	76	89	85	80	69	58	68
$\delta = x - y$	-3	-2	1	-1	-3	-2	1	2

Spočteme její výběrový průměr a rozptyl (pro  $n = 8$ ):

$$\bar{\delta} = -\frac{7}{8} = -0.875, \quad s_{\delta}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\delta_i - \bar{\delta})^2 = \frac{215}{56} \doteq 3.8393 ,$$

určíme realizaci statistiky

$$t = \frac{\bar{\delta}}{s_{\delta}} \sqrt{n} = -\frac{7\sqrt{7}}{\sqrt{215}} \doteq -1.263$$

a příslušný kvantil

$$q_{t(n-1)}(\alpha) = -q_{t(n-1)}(1 - \alpha) = -q_{t(7)}(0.95) \doteq -1.895 .$$

Protože

$$t \doteq -1.263 \not< -1.895 \doteq q_{t(7)}(0.05) ,$$

nulovou hypotézu, že praváci mají delší levý prostředníček než pravý, **NEZAMÍTÁME**.

### 12.3 (test nekorelovanosti dvou výběrů z normálních rozdělení)

U jednoho druhu zvířat byla měřena hmotnost v kg (veličina  $X$ ) a vzdálenost, kterou průměrně urazil jedinec za den v km (veličina  $Y$ ):

$X$	22	15	30	27	29
$Y$	10	6	8	4	8

náhodných výběrů z veličin  $X, Y$  testujte na hladině významnosti  $\alpha = 5\%$  jejich nekorelovanost.

#### Řešení:

Pro test korelovanosti je potřeba předpoklad, že náhodný vektor  $(X, Y)$  má dvourozměrné normální rozdělení.

**Poznámka:** Každé takové rozdělení je tvaru

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}} \begin{pmatrix} X' \\ Y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}$$

kde matice  $\mathbf{A}$  je regulární,  $\mu_1, \mu_2 \in \mathbb{R}$  a veličiny  $X', Y'$  jsou nezávislé s normovaným normálním rozdělením  $N(0, 1)$ .

Označme si ještě  $\vec{u} = (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$  a  $\vec{v} = (\gamma, \delta) \in \mathbb{R}^2$ . Snadno je pak vidět, že

$$E(X) = \mu_1, \quad E(Y) = \mu_2, \quad D(X) = \|\vec{u}\|^2, \quad D(Y) = \|\vec{v}\|^2$$

a pro korelaci máme

$$\rho(X, Y) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|}$$

což je právě kosinus úhlu mezi vektory  $\vec{u}$  a  $\vec{v}$ .

Graf sdružené hustoty pro  $(X', Y')$  vznikne rotací grafu hustoty  $f_{N(0,1)}$  normálního rozdělení  $N(0, 1)$  kolem osy vedené počátkem souřadnic (tj. je to takový "kopec"). Sdružená hustota pro  $(X, Y)$  pak vznikne prostě jen posunutím středu předchozí hustoty do bodu  $(\mu_1, \mu_2)$ , deformací a otočením kolem nového středu, takže vrstevnice této nové hustoty mají tvar natočených soustředných elips. Konkrétně je to:

$$f_{(X', Y')}(x', y') = f_{N(0,1)}(x') \cdot f_{N(0,1)}(y') \quad \text{pro } (x', y') \in \mathbb{R}^2$$

$$f_{(X, Y)}(x, y) = \frac{1}{\det \mathbf{A}} \cdot f_{(X', Y')}((x - \mu_1, y - \mu_2) \cdot (\mathbf{A}^T)^{-1}) \quad \text{pro } (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

My budeme testovat hypotézu o koeficientu korelace  $\rho(X, Y)$  mezi náhodnými veličinami  $X$  a  $Y$ ,

$\mathbf{H}_0$  :  $\rho(X, Y) = 0$  (tj. náhodné veličiny  $X$  a  $Y$  jsou nekorelované)

proti alternativní hypotéze

$\mathbf{H}_1$  :  $\rho(X, Y) \neq 0$  (tj. náhodné veličiny  $X$  a  $Y$  jsou korelované.)

K testování použijeme výběrový koeficient korelace  $R(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$  a testovou statistiku

$$T = \frac{R(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-R^2(\mathbf{X}, \mathbf{Y})}},$$

která má (za předpokladu  $\rho(X, Y) = 0$ ) Studentovo rozdělení  $t(n-2)$ , kde  $n$  je rozsah výběrů. Realizaci  $r(\mathbf{x}, \mathbf{y})$  výběrového koeficientu korelace  $R(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$  vypočteme ze vzorce

$$r(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \left( \sum_{i=1}^n x_i \right) \cdot \left( \sum_{i=1}^n y_i \right)}{\sqrt{\left( n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left( \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \right) \cdot \left( n \sum_{i=1}^n y_i^2 - \left( \sum_{i=1}^n y_i \right)^2 \right)}} = \frac{n}{n-1} \frac{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j y_j - \bar{x} \bar{y}}{s_x s_y}.$$

Za předpokladu nulové hypotézy  $\mathbf{H}_0$ , tj.  $\rho(X, Y) = 0$ , je očekávaná hodnota statistiky  $T$  rovna 0. Kritérium pro **ZAMÍTNUTÍ** proto (podobně jako pro některé předchozí testy) bude tvaru

$$\mathbf{H}_0 \text{ zamítáme (na dané hladině } \alpha) \Leftrightarrow |t| > q_{t(n-2)} \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right).$$

Je  $n = 5$ ,

$$\sum_{i=1}^n x_i = 123, \quad \sum_{i=1}^n y_i = 36, \quad \sum_{i=1}^n x_i^2 = 3179, \quad \sum_{i=1}^n y_i^2 = 280, \quad \sum_{i=1}^n x_i y_i = 890.$$

Po dosažení hodnot dostaneme

$$r(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{4450 - 4428}{\sqrt{766 \cdot 104}} = \frac{11}{2\sqrt{4979}} \doteq 0.07794$$

$$t = \frac{r(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2(\mathbf{x}, \mathbf{y})}} = \sqrt{\frac{363}{19795}} \doteq 0.1354.$$

Z tabulek nalezneme kvantil

$$q_{t(n-2)} \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) = q_{t(3)}(0.975) \doteq 3.18.$$

Protože

$$|t| \doteq 0.1354 \not\geq 3.18 \doteq q_{t(3)}(0.975),$$

hypotézu  $\mathbf{H}_0$  **NEZAMÍTÁME**.

**Poznámky k testu dobré shody:** Chceme otestovat (na hladině  $\alpha$ ), jestli daná veličina  $X$  s konečně mnoha (navzájem různými!) hodnotami  $a_1, \dots, a_k$  (ne nutně číselnými) má předepsané pravděpodobnosti  $(p_1, \dots, p_k)$ , tedy nulovou hypotézu

$$\mathbf{H}_0 : P(X = a_i) = p_i \text{ pro všechna } i \in \{1, \dots, k\}$$

proti alternativní hypotéze:

$$\mathbf{H}_A : P(X = a_{i_0}) \neq p_{i_0}, \text{ pro alespoň jedno } i_0 \in \{1, \dots, k\}$$

Při  $n$  pokusech s veličinou  $X$  si pro  $i = 1, \dots, k$  označme veličiny

$$N_i = \text{“počet výskytů případu } X = a_i \text{ při } n \text{ pokusech”}.$$

Máme tedy náhodný vektor

$$\mathbf{N} = (N_1, \dots, N_k)$$

a vztah  $N_1 + \dots + N_k = n$ . Už z toho vidíme, že veličiny  $N_i$  nejsou nezávislé, ale zase k té nezávislosti tak daleko nemají. Náhodný vektor  $\mathbf{N}$  má tzv. multinomické rozdělení a jednotlivá marginální rozdělení veličin jsou binomická, konkrétně  $N_i \sim \text{Bi}(n, p_i)$ . Speciálně tedy  $E(N_i) = n \cdot p_i$ .

Jako testovací veličinu zde používáme:

$$T = \sum_{i=1}^k \frac{(N_i - n \cdot p_i)^2}{n \cdot p_i}$$

která má asymptoticky (tj. pro  $n \rightarrow \infty$ ) tzv.  $\chi^2$ -rozdělení s  $k - 1$  stupni volnosti. Pro praktické použití této asymptotiky se obvykle požaduje, aby platilo, že

$$n \cdot p_i \geq 5 \text{ pro všechna } i \in \{1, \dots, k\}.$$


Hodnoty  $n \cdot p_i$  se označují jako tzv. *teoretické četnosti*.

Pokud tedy platí nulová hypotéza  $\mathbf{H}_0$ , měly by být hodnoty veličiny  $T$  malé. Jestliže hodnoty  $T$  budou příliš velké, bude to důvod k zamítnutí nulové hypotézy.

Jak určit hranici, kde už nastane zamítnutí: veličina  $T$  má (přibližně)  $\chi^2(k-1)$  rozdělení, tedy platí

$$P_{(H_0 \text{ platí})}(T > q_{\chi^2(k-1)}(1-\alpha)) \doteq \alpha$$

kde  $q_{\chi^2(k-1)}(1-\alpha)$  je hodnota kvantilu pro  $\chi^2(k-1)$  rozdělení (viz obrázek, kde  $\alpha$  je velikost žluté plochy pod hustotou  $f_{\chi^2(k-1)}(x)$  pro  $\chi^2(k-1)$  rozdělení).



Kritérium pro **ZAMÍTNUTÍ  $\mathbf{H}_0$**  (na hladině  $\alpha$ ) proto volíme jako

$$\mathbf{H}_0 \text{ zamítáme (na hladině } \alpha) \Leftrightarrow t > q_{\chi^2(k-1)}(1-\alpha) .$$

Z definice chyby 1. druhu, tj.

$$\text{nastává chyba 1. druhu} \Leftrightarrow (\text{hypotéza } \mathbf{H}_0 \text{ platí} \ \& \ \text{my ji zamítáme})$$

pak totiž máme, že

$$\begin{aligned} P_{(H_0 \text{ platí})}(\text{nastává chyba 1. druhu}) &= P_{(H_0 \text{ platí})}(\text{zamítáme } \mathbf{H}_0 \text{ (na hladině } \alpha)) = \\ &= P_{(H_0 \text{ platí})}(T > q_{\chi^2(k-1)}(1-\alpha)) \doteq \alpha \end{aligned}$$

neboli pravděpodobnost chyby 1. druhu (ovšem za předpokladu platnosti  $\mathbf{H}_0$ !) je pak omezena hodnotou  $\alpha$ .

#### 12.4 (test dobré shody - geometrické rozdělení)

Při házení mincí jsme zaznamenávali, kdy nám poprvé padne líc. Veličina  $X$  měřící počet neúspěchů před prvním úspěchem měla následující četnosti výsledků:

hodnota	0	1	2	3	4	5	6
pozorovaná četnost	29	15	10	5	3	0	2

Posuďte na hladině významnosti  $\alpha = 0.05$  hypotézu, že náhodná veličina  $X$  má geometrické rozdělení s parametrem  $q = 1/2$ , tj. pravděpodobnostní funkce je  $p_X(i) = q^i(1-q) = (\frac{1}{2})^{i+1}$ ,  $i \in \mathbb{N}_0$ .

#### Řešení:

Veličina s geometrickým rozdělením nabývá nekonečně mnoha hodnot. Test dobré shody je ale možné dělat jen s veličinou s *konečně* mnoha hodnotami. Proto musíme některé hodnoty sloučit do jediné skupiny. Zde se přirozeně nabízí udělat to pro hodnoty 6 a výše. Pravděpodobnost pro tuto skupinu je pak součet pravděpodobností jednotlivých hodnot v této skupině. V našem případě je

$$P(X \geq 6) = 1 - P(X < 6) = 1 - \sum_{i=0}^5 p_X(i) = 1 - \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} \right) = \frac{1}{64} .$$

Při testu dobré shody porovnáváme naměřené četnosti s očekávanými četnostmi. Rozsah souboru (tj. počet měření) je  $n = 29 + 15 + 10 + 5 + 3 + 0 + 2 = 64$ . Naší tabulku tedy zpřesníme a doplníme o teoretické pravděpodobnosti  $p_i$  a teoretické (tj. očekávané) četnosti  $n \cdot p_i$ :

položka $i$	0	1	2	3	4	5	$\geq 6$
pozorovaná četnost $n_i$	29	15	10	5	3	0	2
teoretická pravděpodobnost $p_i$	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/64
teoretická četnost $n \cdot p_i$	32	16	8	4	2	1	1

Další podmínkou pro test dobré shody je to, aby jednotlivé položky měly **TEORETICKÉ** četnosti  $n \cdot p_i \geq 5$ . Pokud tomu tak není, je potřeba položky vhodně sloučit tak, abychom této hranice dosáhli. Zde se opět nabízí udělat to pro hodnoty  $i \geq 3$ .

Původní veličinu  $X$  tedy nakonec nahradíme veličinou  $X'$  popsanou následující tabulkou:

položka $i$	0	1	2	$\geq 3$
pozorovaná četnost $n_i$	29	15	10	10
teoretická pravděpodobnost $p_i$	1/2	1/4	1/8	1/8
teoretická četnost $n \cdot p_i$	32	16	8	8

Nyní už můžeme zformulovat naši nulovou hypotézu

$$\mathbf{H}_0 : \text{pro pravděpodobnosti hodnot veličiny } X' \text{ platí } (p_0, p_1, p_2, p_{\geq 3}) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}\right),$$

kterou budeme testovat proti alternativní hypotéze:

$$\mathbf{H}_1 : \text{pro pravděpodobnosti hodnot veličiny } X' \text{ platí } (p_0, p_1, p_2, p_{\geq 3}) \neq \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}\right).$$

Pro test dobré shody používáme určitou statistiku  $T$  (viz poznámka výše), jejíž *realizace*  $t$  se počítá vzorcem

$$t = \sum_{i \in K} \frac{(n_i - n \cdot p_i)^2}{n \cdot p_i},$$

kde  $K$  je množina položek veličiny  $X$  a  $k = |K|$  je jejich počet. Rozdělení statistiky  $T$  se pro  $n \rightarrow \infty$  blíží k  $\chi^2(k-1)$ -rozdělení s  $k-1$  stupni volnosti (právě kvůli přibližnosti jsme také potřebovali teoretické četnosti  $\geq 5$ ).

Kritérium pro **ZAMÍTNUTÍ** (viz opět poznámka výše) bude podobné jako u jednostranného testu rozptylu (protože jde opět o  $\chi^2$ -rozdělení). Je tedy tvaru

$$\mathbf{H}_0 \text{ zamítáme (na dané hladině } \alpha) \Leftrightarrow t > q_{\chi^2(k-1)}(1 - \alpha).$$

V našem případě máme  $k = 4$ . Hodnota statistiky je

$$t = \frac{(29 - 32)^2}{32} + \frac{(15 - 16)^2}{16} + \frac{(10 - 8)^2}{8} + \frac{(10 - 8)^2}{8} = 1.34375$$

a hodnota kvantilu je

$$q_{\chi^2(k-1)}(1 - \alpha) = q_{\chi^2(3)}(0.95) \doteq 7.815.$$

Protože

$$t = 1.34375 \not> 7.815 \doteq q_{\chi^2(3)}(0.95),$$

nulovou hypotézu  $\mathbf{H}_0$  pro veličinu  $X'$  **NEZAMÍTÁME**. Tento výsledek interpretujeme tak, že hypotézu

$$X \text{ má geometrické rozdělení s parametrem } q = 1/2,$$

rovněž **NEZAMÍTÁME**.

**12.5** (test dobré shody - rozdělení dané geometrickou pravděpodobností)

Chceme zjistit, zda si jistý druh ptáka buduje hnízda rovnoměrně po krajině. K tomu jsme rozdělili testovací region na 6 souvislých částí, jejichž rozlohy v km<sup>2</sup> jsou uvedeny v tabulce. Tabulka udává i počet hnízd nalezených v dané části regionu. Za hladinu významnosti považujte  $\alpha = 5\%$ .

oblast	A	B	C	D	E	F
rozloha (v km <sup>2</sup> )	5	10	10	5	15	15
počet hnízd	14	22	28	12	40	34

**Řešení:**

Využijeme test dobré shody. Počet hnízd v regionu je  $n = 14 + 22 + 28 + 12 + 40 + 34 = 150$ . Označíme  $X_i$ ,  $i \in \{1, \dots, n\}$ , veličinu nabývající hodnot  $A, \dots, F$ , v závislosti na tom, v které části regionu leží  $i$ -té hnízdo. Neboli máme veličinu

$$X(\text{"dané hnízdo"}) = \text{"oblast, ve které hnízdo leží"}$$

a  $X_i$  jsou její kopie v jednotlivých pokusech (tedy jsou to nezávislé veličiny se stejným rozdělením).

Celkově rozloha testovacího regionu je  $S = 5 + 10 + 10 + 5 + 15 + 15 = 60$  km<sup>2</sup>. Protože předpokládáme rovnoměrné rozdělení po krajině, bude pravděpodobnost  $p_j$  nalezení hnízda v dané oblasti  $j \in \{A, \dots, F\}$  úměrná její velikosti, tj. daná geometrickou pravděpodobností jako

$$p_j = \frac{\text{"rozloha oblasti } j"}{S}.$$

Můžeme tedy doplnit tabulku následovně:

oblast	A	B	C	D	E	F
rozloha (v km <sup>2</sup> )	5	10	10	5	15	15
počet hnízd $n_j$	14	22	28	12	40	34
teoretická pravděpodobnost $p_j$	$\frac{5}{60} = \frac{1}{12}$	$\frac{10}{60} = \frac{1}{6}$	$\frac{10}{60} = \frac{1}{6}$	$\frac{5}{60} = \frac{1}{12}$	$\frac{15}{60} = \frac{3}{12}$	$\frac{15}{60} = \frac{3}{12}$
teoretický počet hnízd $np_j$	12.5	25	25	12.5	37.5	37.5
příspěvek ke statistice $\frac{(n_j - np_j)^2}{np_j}$	0.18	0.36	0.36	0.02	0.167	0.327

Hypotézu tedy vyjádříme konkrétně:

$$\mathbf{H}_0 : \text{pro pravděpodobnosti hodnot veličiny } X \text{ platí } (p_A, \dots, p_F) = \left(\frac{1}{12}, \dots, \frac{3}{12}\right),$$

a alternativní hypotéza bude:

$$\mathbf{H}_1 : \text{pro pravděpodobnosti hodnot veličiny } X \text{ platí } (p_A, \dots, p_F) \neq \left(\frac{1}{12}, \dots, \frac{3}{12}\right).$$

Realizace testovací statistiky  $T$  je

$$t = \sum_{j=A}^F \frac{(n_j - np_j)^2}{np_j} = 0.18 + \dots + 0.327 = 1.413$$

Porovnáme ji s tabulkovou hodnotou kvantilu

$$q_{\chi^2(5)}(1 - \alpha) \doteq 11.1 > 1.413 = t.$$

Na hladině významnosti 5 % tedy nemůžeme zamítnout, že si pták buduje hnízda rovnoměrně po krajině.



**Poznámky k testu nezávislosti:** Máme veličiny

- $X$  s (různými) hodnotami  $\{a_1, \dots, a_k\}$  a
- $Y$  s (různými) hodnotami  $\{b_1, \dots, b_\ell\}$

a chceme otestovat (na hladině  $\alpha$ ), hypotézu

$H_0$ : rozdělení veličin  $X$  a  $Y$  jsou *nezávislá*

proti alternativní hypotéze:

$H_A$ : rozdělení veličin  $X$  a  $Y$  jsou *závislá*

Při  $n$  pokusech s náhodným vektorem  $(X, Y)$  si pro  $i = 1, \dots, k$  označme veličiny

$$N_{i,j} = \text{“počet výskytů případu } (X, Y) = (a_i, b_j) \text{ při } n \text{ pokusech”} .$$

a opět máme náhodný vektor

$$\mathbf{N} = (N_{1,1}, \dots, N_{k,\ell})$$

s multinomickým rozdělením. Marginální rozdělení jednotlivých veličin  $N_{i,j}$  jsou opět binomická a *za předpokladu nezávislosti  $X$  a  $Y$*  mají střední hodnotu

$$E(N_{i,j}) = n \cdot P(X = a_i, Y = b_j) \stackrel{(\text{nezáv.})}{=} n \cdot P(X = a_i) \cdot P(Y = b_j) .$$

Podobně jako v testu dobré shody by tyto střední hodnoty představovaly teoretické četnosti až na to, že pravděpodobnosti  $P(X = a_i)$  a  $P(Y = b_j)$  nemáme v hypotéze uvedeny. Proto je odhadneme jako

$$P(X = a_i) \doteq \frac{n_{i,\bullet}}{n} \quad \text{a} \quad P(Y = b_j) \doteq \frac{n_{\bullet,j}}{n}$$

kde  $n_{i,\bullet}$  a  $n_{\bullet,j}$  jsou naměřené hodnoty veličin

$$N_{i,\bullet} = \sum_{j=1}^{\ell} N_{i,j} = \text{“počet výskytů případu } X = a_i \text{ při } n \text{ pokusech”}$$

$$N_{\bullet,j} = \sum_{i=1}^k N_{i,j} = \text{“počet výskytů případu } Y = b_j \text{ při } n \text{ pokusech”}$$

což jsou tzv. *marginální četnosti*.

Z tohoto důvodu jako testovací veličinu volíme:

$$T = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{\ell} \frac{\left( N_{i,j} - \frac{N_{i,\bullet} \cdot N_{\bullet,j}}{n} \right)^2}{\frac{N_{i,\bullet} \cdot N_{\bullet,j}}{n}}$$

která má asymptoticky (tj. pro  $n \rightarrow \infty$ ) opět  $\chi^2$ -rozdělení, tentokrát ale s  $(k-1) \cdot (\ell-1)$  stupni volnosti. Pro praktické použití této asymptotiky se obvykle opět požaduje, aby platilo, že

$$\frac{n_{i,\bullet} \cdot n_{\bullet,j}}{n} \geq 5 \quad \text{pro všechna } i = 1, \dots, k \text{ a } j = 1, \dots, \ell.$$

Kritérium pro **ZAMÍTNUTÍ  $H_0$**  (na hladině  $\alpha$ ) volíme podobně jako u testu dobré shody a sice

$$\mathbf{H_0 \text{ zamítáme (na hladině } \alpha)} \Leftrightarrow t > q_{\chi^2_{(k-1) \cdot (\ell-1)}}(1 - \alpha) .$$

## 12.6 (test nezávislosti veličin)

Na  $n = 100$  lidech byla pozorována barva očí a vlasů. Data jsou shrnuta v tabulce. Na hladině  $\alpha = 5\%$  testujte hypotézu o nezávislosti barvy očí a vlasů.

	Vlasy	tmavé	světlé
Oči			
modré		10	20
šedé		10	10
hnědé		40	10

### Řešení:

Označme si veličiny

$X = \text{“barva očí daného člověka”}$

$Y = \text{“barva vlasů daného člověka”}$

a dále budeme pracovat s náhodným vektorem  $(X, Y)$ , tj. u daného člověka budeme zjišťovat barvu očí a barvu vlasů.

Budeme testovat hypotézu:

$H_0$  : rozdělení veličin  $X$  a  $Y$  jsou *nezávislá*

proti alternativní hypotéze:

$H_1$  : rozdělení veličin  $X$  a  $Y$  jsou *závislá*.

na hladině významnosti  $\alpha = 5\%$ .

Četnost případu  $(X, Y) = (i, j)$  v tabulce označme jako  $n_{i,j}$  a marginální četnosti pak budou

$$n_{i,\bullet} = \sum_j n_{i,j} \text{ pro případ } X = i$$

$$n_{\bullet,j} = \sum_i n_{i,j} \text{ pro případ } Y = j.$$

což jsou součty v řádcích a sloupcích tabulky:

$n_{i,j}$				
	( $Y =$ ) $j$	tmavé	světlé	$n_{i,\bullet}$
( $X =$ ) $i$				
modré		10	20	30
šedé		10	10	20
hnědé		40	10	50
$n_{\bullet,j}$		60	40	

Za předpokladu  $H_0$  pak jako teoretické četnosti budeme chápat hodnoty  $\frac{n_{i,\bullet} \cdot n_{\bullet,j}}{n}$  v této tabulce:

$\frac{n_{i,\bullet} \cdot n_{\bullet,j}}{n}$				
	( $Y =$ ) $j$	tmavé	světlé	$n_{i,\bullet}$
( $X =$ ) $i$				
modré		$\frac{30 \cdot 60}{100} = 18$	$\frac{30 \cdot 40}{100} = 12$	30
šedé		$\frac{20 \cdot 60}{100} = 12$	$\frac{20 \cdot 40}{100} = 8$	20
hnědé		$\frac{50 \cdot 60}{100} = 30$	$\frac{50 \cdot 40}{100} = 20$	50
$n_{\bullet,j}$		60	40	

Podmínka na tyto teoretické (tj. očekávané) četnosti  $\geq 5$  je splněna, takže test nezávislosti můžeme použít. Pro hodnotu testovací statistiky dostaneme

$$t = \sum_{i,j} \frac{\left(n_{i,j} - \frac{n_{i,\bullet} \cdot n_{\bullet,j}}{n}\right)^2}{\frac{n_{i,\bullet} \cdot n_{\bullet,j}}{n}} =$$

$$= \frac{(10-18)^2}{18} + \frac{(10-12)^2}{12} + \frac{(40-30)^2}{30} + \frac{(20-12)^2}{12} + \frac{(10-8)^2}{8} + \frac{(10-20)^2}{20} = 18 + \frac{1}{18} \doteq 18.056 .$$

Tuto hodnotu dále porovnáme s hodnotou kvantilu  $\chi^2$  pro  $(k-1)(\ell-1)$  stupňů volnosti, kde  $k$  je počet položek veličiny  $X$  a  $\ell$  je počet položek veličiny  $Y$ . Tento počet je nyní jiný, než by byl u “obvyklého” testu dobré shody s  $k \cdot \ell$  položkami, protože data jsme použili k odhadu marginálních pravděpodobností.

Kritérium pro **ZAMÍTNUTÍ  $H_0$**  (na hladině  $\alpha$ ) bude tedy tvaru

$$\mathbf{H}_0 \text{ zamítáme (na hladině } \alpha) \Leftrightarrow t > q_{\chi^2_{(k-1)(\ell-1)}}(1-\alpha) .$$

Hledaný kvantil je

$$q_{\chi^2_{(3-1)(2-1)}}(1-\alpha) = q_{\chi^2(2)}(0.95) \doteq 5.992 .$$

Protože

$$t \doteq 18.056 > 5.992 \doteq q_{\chi^2(2)}(0.95) ,$$

hypotézu o nezávislosti **ZAMÍTÁME**.

### 12.7 (test nezávislosti veličin)

V přímořském středisku probíhá kurz surfování a vodních lyží pro děti. Vybíráme 100 účastníků a sledujeme následující rozdělení sportů mezi chlapce a dívky:

	surf	vodní lyže
chlapci	40	20
dívky	20	20

- (a) Testujte na hladině  $\alpha = 1\%$ , zda je druh sportu nezávislý na tom, zda je zvolen chlapcem nebo dívkou.  
 (b) Testujte na hladině  $\alpha = 5\%$ , zda jsou počty chlapců a dívek účastnících se kurzu přibližně stejné.

#### Řešení:

Nechť veličina  $X$  označuje pohlaví daného dítěte a  $Y$  druh sportu, který si vybralo.

(a) Budeme testovat hypotézu:

$\mathbf{H}_0$  : rozdělení veličin  $X$  a  $Y$  jsou *nezávislá*

proti alternativní hypotéze:

$\mathbf{H}_1$  : rozdělení veličin  $X$  a  $Y$  jsou *závislá*.

na hladině významnosti  $\alpha = 5\%$ .

Naměřené četnosti  $n_{i,j}$  a marginální četnosti  $n_{i,\bullet}$  a  $n_{\bullet,j}$  pak budou:

$n_{i,j}$ ( $X =$ ) $i$ (Y =) $j$	surf	vodní lyže	$n_{i,\bullet}$
chlapci	40	20	60
dívky	20	20	40
$n_{\bullet,j}$	60	40	

Celkový počet dětí je  $n = \sum_{i,j} n_{ij} = 40 + 20 + 20 + 20 = 100$ . Za předpokladu  $\mathbf{H}_0$  pak teoretické četnosti  $\frac{n_{i,\bullet} \cdot n_{\bullet,j}}{n}$  v této tabulce budou:

$\frac{n_{i,\bullet} \cdot n_{\bullet,j}}{n}$ ( $X =$ ) $i$ (Y =) $j$	surf	vodní lyže	$n_{i,\bullet}$
chlapci	$\frac{60 \cdot 60}{100} = 36$	$\frac{40 \cdot 60}{100} = 24$	60
dívky	$\frac{60 \cdot 40}{100} = 24$	$\frac{40 \cdot 40}{100} = 16$	40
$n_{\bullet,j}$	60	40	

Podmínka na tyto teoretické (tj. očekávané) četnosti  $\geq 5$  je splněna, takže test nezávislosti můžeme použít. Pro hodnotu testovací statistiky dostaneme

$$t = \sum_{i,j} \frac{\left(n_{i,j} - \frac{n_{i,\bullet} \cdot n_{\bullet,j}}{n}\right)^2}{\frac{n_{i,\bullet} \cdot n_{\bullet,j}}{n}} =$$

$$= \frac{(40 - 36)^2}{36} + \frac{(20 - 24)^2}{24} + \frac{(20 - 24)^2}{24} + \frac{(20 - 16)^2}{16} \doteq 2.78 .$$

Tuto hodnotu dále porovnáme s hodnotou kvantilu  $\chi^2$  pro  $(k - 1)(\ell - 1) = 1$  stupňů volnosti, kde  $k = 2$  je počet položek veličiny  $X$  a  $\ell = 2$  je počet položek veličiny  $Y$ .

Kritérium pro **ZAMÍTNUTÍ**  $\mathbf{H}_0$  (na hladině  $\alpha$ ) bude tedy tvaru

$$t > q_{\chi^2(1-\alpha)} \Leftrightarrow \text{zamítáme } \mathbf{H}_0 \text{ (na hladině } \alpha \text{)} .$$

Hledaný kvantil je

$$q_{\chi^2_1}(1 - \alpha) = q_{\chi^2_1}(0.99) = 6.63 .$$

Protože

$$t \doteq 2.78 \not> 6.63 \doteq q_{\chi^2_1}(0.99) ,$$

hypotézu o nezávislosti **NEZAMÍTÁME**.

(b) V tomto případě budeme uvažovat pouze veličinu  $X$  a testovat (na hladině  $\alpha = 5\%$ ) hypotézu

$$\tilde{\mathbf{H}}_0 : \text{veličina } X \text{ má rozdělení s pravděpodobnostmi } (p_1, p_2) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right),$$

proti alternativní hypotéze

$$\tilde{\mathbf{H}}_A : \text{veličina } X \text{ má rozdělení jiné než } \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

Využijeme teď opět test dobré shody. Celkový počet měření je zase  $n = 100$ . Naměřené četnosti odpovídají už spočítaným marginálním četnostem pro hodnoty veličiny  $X$ , tedy  $n_i = n_{i,\bullet}$ . Pro přehlednost si zase vypíšeme tabulku s jednotlivými četnostmi (pozorovanými i teoretickými):

$i$	chlapci	dívky
$n_i$ (pozorované četnosti)	60	40
$p_i$ (teoretické pravděpodobnosti)	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$n \cdot p_i$ (teoretické četnosti)	$100 \cdot \frac{1}{2} = 50$	$100 \cdot \frac{1}{2} = 50$

Vidíme, že všechny teoretické četnosti jsou  $\geq 5$ , takže můžeme použít asymptotické přiblížení pro testovací statistiku  $T$ . Teď už si jen spočítáme hodnotu této statistiky

$$t = \sum_i \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i} = \frac{(60 - 50)^2}{50} + \frac{(40 - 50)^2}{50} = 2 + 2 = 4$$

a porovnáme s kvantilem  $\chi^2$ -rozdělení s  $k - 1 = 2 - 1 = 1$  stupněm volnosti:

$$t = 4 > 3.84 \doteq q_{\chi^2_1}(0.95) = q_{\chi^2_1}(1 - \alpha)$$

Protože zamítací kritérium JE splněno, tak  $\tilde{\mathbf{H}}_0$  **ZAMÍTÁME** (na hladině  $\alpha$ ).

**Poznámky k testu shody rozdělení dvou veličin:** Máme veličiny  $X$  a  $Y$  se *stejným* oborem hodnot tvořeným (různými) hodnotami  $\{a_1, \dots, a_k\}$  a chceme otestovat (na hladině  $\alpha$ ), hypotézu

$\mathbf{H}_0$ : veličiny  $X$  a  $Y$  mají stejná rozdělení

proti alternativní hypotéze:

$\mathbf{H}_A$ : veličiny  $X$  a  $Y$  nemají stejná rozdělení

Rozdělení  $X$  ani  $Y$  neznáme. Za předpokladu platnosti  $\mathbf{H}_0$ , tj.

$$P(X = a_i) = p_i = P(Y = a_i) \text{ pro všechna } i = 1, \dots, k$$

můžeme  $p_i$  odhadnout průměrnou hodnotou

$$p_i \doteq a_i \text{ kde } a_i := \frac{n_i + m_i}{n + m}$$

a  $n_i$  je naměřená četnost položky  $i$  pro veličinu  $X$  a (podobně)  $m_i$  je naměřená četnost položky  $i$  pro veličinu  $Y$ . Statistika  $T$  se pak volí taková, že její realizace  $t$  je dána jako

$$t = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - n \cdot a_i)^2}{n \cdot a_i} + \sum_{i=1}^k \frac{(m_i - m \cdot a_i)^2}{m \cdot a_i}$$

kde hodnoty  $n \cdot a_i$  a  $m \cdot a_i$  chápeme jako teoretické četnosti a proto opět požadujeme, aby platilo, že

$$n \cdot a_i \geq 5 \text{ a } m \cdot a_i \geq 5 \text{ pro všechna } i$$

Zamítací kritérium, kde používáme kvantil  $q_{\chi^2(k-1)}$  (pozor, počet stupňů volnosti je jen  $k - 1$ ), je pak tvaru

$$\mathbf{H}_0 \text{ zamítáme (na hladině } \alpha) \Leftrightarrow t > q_{\chi^2(k-1)}(1 - \alpha).$$

## 12.8 (test shody dvou rozdělení)

Následující tabulka uvádí počty studentů, kteří dosáhli daného bodového ohodnocení z testu v jednotlivých skupinách (v 1. a 2. skupině).

počet bodů ( $i$ )	1	2	3	4	5	rozsah
počet studentů v 1. skupině ( $n_i$ )	4	2	1	6	8	$n = 21$
počet studentů ve 2. skupině ( $m_i$ )	2	0	6	4	13	$m = 25$

Otestujte na hladině významnosti  $\alpha = 5\%$  hypotézu, že obě skupiny mají stejná rozdělení pravděpodobnosti dosažených výsledků (tj. že mezi tím, jak dopadl test v obou skupinách, není statisticky významný rozdíl na dané hladině  $\alpha$ ).

### Řešení:

Jde o test shody dvou rozdělení veličin:

$X$  ("student z 1. skupiny") := "počet bodů, kterých dosáhl"

$Y$  ("student ze 2. skupiny") := "počet bodů, kterých dosáhl"

Obě veličiny mají pochopitelně stejný obor hodnot (jinak bychom se ani nemohli ptát na to, jestli mají stejná rozdělení). Hodnoty obou veličin (které raději budeme označovat jako "položky") nemusíme nutně chápat číselně. Mohly by být klidně označeny i písmeny (např. A,B,C,D,E namísto 1,2,3,4,5).

Chceme tedy otestovat (na hladině  $\alpha$ ), hypotézu

$H_0$ : veličiny  $X$  a  $Y$  mají stejná rozdělení

proti alternativní hypotéze:

$H_A$ : veličiny  $X$  a  $Y$  nemají stejná rozdělení

Součet rozsahu obou souborů je  $n + m = 21 + 25 = 46$ . Protože budeme potřebovat splnit podmínku pro dostatečně velké teoretické četnosti, nejdříve si je spočítáme, abychom viděli, jestli bude potřeba nějaké položky slučovat:

položka $i$	1	2	3	4	5
naměřené četnosti $m_i + n_i$	6	2	7	10	21
odhad pravděpodobnosti $a_i = \frac{n_i+m_i}{n+m}$	$\frac{6}{46}$	$\frac{2}{46}$	$\frac{7}{46}$	$\frac{10}{46}$	$\frac{21}{46}$
teoretické četnosti $n \cdot a_i$	$21 \cdot \frac{6}{46} \doteq 2.74$	$21 \cdot \frac{2}{46} \doteq 0.91$	3.2	4.57	9.59
teoretické četnosti $m \cdot a_i$	$25 \cdot \frac{6}{46} \doteq 3.26$	$25 \cdot \frac{2}{46} \doteq 1.09$	3.8	5.44	11.41

Vidíme, že v prvních čtyřech sloupcích nejsou dostatečně velké teoretické četnosti. Když je sloučíme, dosáhneme teoretické četnosti alespoň 5. (Také bychom ovšem mohli sloučit např. první tři sloupce do jedné položky a zbylé dva do druhé položky.) Tím samozřejmě vytvoříme nové veličiny  $X'$  a  $Y'$  a hypotézu o stejných rozděleních pak testujeme pro tyto nové veličiny. Máme tedy novou tabulku:

položka $i$	1až4	5
naměřené četnosti $n'_i$ (pro $X'$ )	13	8
naměřené četnosti $m'_i$ (pro $Y'$ )	12	13
naměřené četnosti $m'_i + n'_i$	25	21
odhad pravděpodobnosti $a'_i = \frac{n'_i+m'_i}{n+m}$	$\frac{25}{46}$	$\frac{21}{46}$
teoretické četnosti $n \cdot a'_i$	$21 \cdot \frac{25}{46} \doteq 11.41$	$21 \cdot \frac{21}{46} \doteq 9.59$
teoretické četnosti $m \cdot a'_i$	$25 \cdot \frac{25}{46} \doteq 13.59$	$25 \cdot \frac{21}{46} \doteq 11.41$

a testujeme hypotézu

$H'_0$ : veličiny  $X'$  a  $Y'$  mají stejná rozdělení

proti alternativní hypotéze:

$\mathbf{H}'_A$ : veličiny  $X'$  a  $Y'$  nemají stejná rozdělení

Hodnota testovací statistiky je

$$t' = \sum_i \frac{(n'_i - n \cdot a'_i)^2}{n \cdot a'_i} + \sum_i \frac{(m'_i - m \cdot a'_i)^2}{m \cdot a'_i} =$$
$$= \frac{(13 - 11.41)^2}{11.41} + \frac{(8 - 9.59)^2}{9.59} + \frac{(12 - 13.59)^2}{13.59} + \frac{(13 - 11.41)^2}{11.41} \doteq 0.893$$

a hodnota kvantilu je

$$q_{\chi^2(2-1)}(1 - \alpha) = q_{\chi^2(1)}(0.95) \doteq 3.84 .$$

Protože

$$t = 0.893 \not\geq 3.84 \doteq q_{\chi^2(1)}(0.95) ,$$

nulovou hypotézu  $\mathbf{H}_0$  pro veličiny  $X'$  a  $Y'$  **NEZAMÍTÁME**. Tento výsledek interpretujeme tak, že hypotézu  $\mathbf{H}_0$

*$X$  a  $Y$  mají stejná rozdělení,*

rovněž **NEZAMÍTÁME**.