

KAPITOLA 4: Normované prostory

8. dubna 2020

X, Y vektorové prostory nad \mathbb{R} nebo \mathbb{C} .

Definice: Norma na X je funkce $\|\cdot\| : X \rightarrow \langle 0, \infty \rangle$ splňující pro všechna $x, y \in X$ a $\alpha \in \mathbb{C}$ (\mathbb{R})

$$(N1) \quad \|x\| \geq 0$$

$$(N2) \quad \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = \mathbf{0}$$

$$(N3) \quad \|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$$

$$(N4) \quad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad (\text{trojúhelníková nerovnost})$$

Dvojici $(X, \|\cdot\|)$ nazýváme **normovaný prostor**.

$\|x\|$ – „velikost vektoru x “

$d(x, y) = \|x - y\|$ – „vzdálenost x a y “ – splňuje trojúhelníkovou nerovnost a je invariantní vůči posunu, protože

$$d(x, y) = \|x - y\| = \|x - z + z - y\| \leq \|x - z\| + \|z - y\| = d(x, z) + d(z, y)$$

$$d(x + z, y + z) = \|(x + z) - (y + z)\| = \|x - y\| = d(x, y)$$

Platí: a) $\|x_1 + x_2 + \dots + x_n\| \leq \|x_1\| + \|x_2\| + \dots + \|x_n\|$.

b) Pro $x \neq 0$ je $\frac{x}{\|x\|} = \frac{1}{\|x\|} x$ jednotkový vektor (tj. má normu rovnou 1).

c) $\|x\| = \|-x\|$.

d) $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|.$

Důkaz: **a)** $\|x_1 + x_2 + \dots + x_n\| = \|x_1 + (x_2 + \dots + x_n)\| \leq \|x_1\| + \|x_2 + \dots + x_n\| \leq \dots \leq \|x_1\| + \|x_2\| + \dots + \|x_n\|,$

b) a **c)** jsou zřejmé. **d)** Z (N4) máme $\|x\| = \|x - y + y\| \leq \|x - y\| + \|y\|,$ odkud $\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|.$ Záměna

x a y dá $\|y\| - \|x\| \leq \|y - x\| = \|x - y\|.$ Celkem tedy dostáváme $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|.$

□

Značení: $B_X = \{x \in X \mid \|x\| \leq 1\}$ ($= \{x \in X \mid d(\mathbf{0}, x) \leq 1\}$) – jednotková (uzavřená) koule v X

Definice: Necht' $(x_n)_{n=1}^\infty$ je posloupnost v X .

(i) Řekneme, že posloupnost (x_n) **konverguje k** $x \in X$, jestliže

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0.$$

Značíme $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x.$

(ii) Řekneme, že posloupnost (x_n) je **cauchyovská**, jestliže

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \quad \forall n, m \geq n_0 : \|x_n - x_m\| \leq \varepsilon.$$

Pozorování: Každá konvergentní posloupnost je cauchyovská. Pro každé $\varepsilon > 0$ totiž existuje n_0 takové, že pro každé $n \geq n_0$ platí $\|x_n - x\| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$ Pro $n, m \geq n_0$ pak máme

$$\|x_n - x_m\| = \|x_n - x + x - x_m\| \leq \|x_n - x\| + \|x - x_m\| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Z cauchyovskosti ale obecně konvergence nevyplývá.

Definice : Normovaný prostor $(X, \|\cdot\|)$ je **úplný (Banachův) prostor**, jestliže je v něm každá cauchyovská posloupnost konvergentní.

Příklad : \mathbb{C} a \mathbb{R} jsou úplné prostory.

Definice : Necht' X je normovaný prostor, $x \in X$, $(x_n)_{n=1}^{\infty} \subset X$. Řekneme, že x je **součtem řady** $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$, píšeme $\sum_{n=1}^{\infty} x_n = x$, jestliže

$$x = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N x_n.$$

Definice : Necht' X je normovaný prostor. Množina $A \subset X$ se nazývá **omezená**, jestliže existuje $K \geq 0$ tak, že

$$\|x\| \leq K \quad \forall x \in A.$$

Tvrzení : Každá cauchyovská posloupnost $(x_n)_{n=1}^{\infty} \subset X$ je omezená.

Důkaz : Z definice cauchyovskosti posloupnosti $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ existuje k $\varepsilon = 1$ přirozené číslo n_0 takové, že pro všechna $n, m \geq n_0$ platí $\|x_n - x_m\| \leq 1$. Tedy pro $n \geq n_0$ máme

$$\|x_n\| = \|x_n - x_{n_0} + x_{n_0}\| \leq \|x_n - x_{n_0}\| + \|x_{n_0}\| \leq 1 + \|x_{n_0}\|.$$

Odtud pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí

$$\|x_n\| \leq \max \left\{ \max_{i=1, \dots, n_0-1} \|x_i\|, 1 + \|x_{n_0}\| \right\}.$$

□

Definice: Necht' X a Y jsou normované prostory (nad stejným tělesem). Pak zobrazení $f : X \rightarrow Y$ definované na $D(f) \subset X$ je **spojité**, jestliže pro každou posloupnost $(x_n)_{n=1}^{\infty} \subset D(f)$ a $x \in D(f)$ takové, že $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x),$$

neboli

$$x_n \rightarrow x \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(x).$$

Tvrzení: Necht' X, Y jsou normované prostory, $f : X \rightarrow Y$ a $\tilde{x} \in D(f)$.

Pak jsou ekvivalentní tvrzení:

- (i) Pro každou posloupnost $(x_n)_{n=1}^{\infty} \subset D(f)$ takovou, že $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \tilde{x}$, platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(\tilde{x}).$$

- (ii) Pro každé $\varepsilon > 0$ existuje $\delta > 0$ takové,

$$\|x - \tilde{x}\|_X < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(\tilde{x})\|_Y < \varepsilon \text{ pro všechna } x \in D(f).$$

Důkaz proveďte jako cvičení. \square

Vlastnosti a příklady: Necht' $(X, \|\cdot\|)$ je normovaný prostor. Pak

- složení dvou spojitých zobrazení je spojitě zobrazení. (Plyne přímo z definice).
- $\|\cdot\| : X \rightarrow \langle 0, \infty \rangle \subset \mathbb{R}, \mathbb{C}$ je spojitá funkce. Jestliže totiž $x_n \rightarrow x$, pak $0 \leq |\|x_n\| - \|x\|| \leq \|x_n - x\| \rightarrow 0$ a podle věty o sevření $\|x_n\| - \|x\| \rightarrow 0$.

- Zobrazení $+$: $X \times X \rightarrow X : (x, y) \mapsto x + y$ je spojité, tj. jestliže $x_n \rightarrow x$ a $y_n \rightarrow y$, pak $x_n + y_n \rightarrow x + y$. (Dokažte jako cvičení.)
- Zobrazení \cdot : $\mathbb{C} \times X \rightarrow X : (\alpha, x) \mapsto \alpha x$ je spojité, tj. jestliže $\alpha_n \rightarrow \alpha$ a $x_n \rightarrow x$, pak $\alpha_n x_n \rightarrow \alpha x$. (Dokažte jako cvičení.)
- Pro pevně zvolené vektory x_1, \dots, x_n v X je zobrazení

$$T : \mathbb{C}^n \rightarrow X : (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \mapsto \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$$

spojité. (Dokažte z předchozích tvrzení.)

Příklad: Uvedme některé často používané normy na $\mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$.

Pro $x = (x_1, \dots, x_n)$ definujeme

- $\|x\|_\infty = \max_{i=1, \dots, n} |x_i|$,
- $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$.
- $\|x\|_2 = \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 + \dots + |x_n|^2}$.

(Nakreslete si, jak vypadají v \mathbb{R}^2 jednotkové „koule“ odpovídající každé z těchto norem.)

Konvergence ve všech těchto prostorech je konvergence po složkách. Ať totiž uvažujeme kteroukoliv z norem $\|\cdot\|_\infty, \|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$, máme

$$x^k = (x_1^k, \dots, x_n^k) \rightarrow x = (x_1, \dots, x_n) \quad \text{právě tehdy, když} \quad x_i^k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} x_i \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

Pro uvedené normy platí (dokažte jako cvičení)

- $\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n\|x\|_\infty$,

- $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n}\|x\|_\infty$.

Příklad: $M_{m \times n}$ – matice typu $m \times n$. Pro

$$A = (a_{ij})_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}} \in M_{m \times n}$$

definujeme např.

$$\|A\|_\infty = \max_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}} |a_{ij}|,$$

$$\|A\|_r = \max_{i=1,\dots,m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

(tedy $\|A\|_r$ je maximální řádkový součet matice A).

$$\|A\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1,j=1}^n |a_{ij}|^2}.$$

(Hilbert-Schmidtova norma.)

Konvergence v obou těchto normách je opět konvergence po složkách.

Definice: Mějme dvě normy $\|\cdot\|_1$ a $\|\cdot\|_2$ na prostoru X . Řekněme, že tyto normy jsou **ekvivalentní**, jestliže existují konstanty $K_1, K_2 > 0$ tak, že

$$K_2\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq K_1\|x\|_2 \quad \forall x \in X.$$

Tvrzení: Relace ekvivalence norem na množině všech norem prostoru X je ekvivalence (tj. reflexivní, symetrická, tranzitivní relace).

Poznámka: Ekvivalentní normy mají stejnou konvergenci a stejné Cauchyovské posloupnosti. Radikálně se však může změnit geometrie.

Příklad: Normy $\|\cdot\|_\infty$, $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ jsou ekvivalentní.

Princip maxima:

Každá spojitá funkce na uzavřené omezené množině v \mathbb{C}^n (a tedy i v \mathbb{R}^n) je omezená a nabývá svého maxima a minima.

Věta: Každé dvě normy na prostoru X konečné dimenze jsou ekvivalentní.

Důkaz: Nechť X je reálný lineární prostor (pro komplexní bychom postupovali analogicky), $\dim X = n$ a x_1, x_2, \dots, x_n je lineární báze prostoru X . Využijeme toho, že každý prvek $z \in X$ je jednoznačně určen svými souřadnicemi vzhledem k bázi (máme tedy lineární bijekci mezi X a \mathbb{R}^n).

Ukážeme, že libovolná norma na X je ekvivalentní s normou $\|\cdot\|_c$ na X definovanou

$$\|\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n\|_c = \underbrace{\|(\alpha_1, \dots, \alpha_n)\|_1}_{\text{norma v } \mathbb{R}^n} = \sum_{i=1}^n |\alpha_i|,$$

kde $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$. Jsou-li pak $\|\cdot\|_a$, $\|\cdot\|_b$ normy na X , jsou každá ekvivalentní s normou $\|\cdot\|_c$ a z tranzitivity ekvivalence je též $\|\cdot\|_a$ ekvivalentní s $\|\cdot\|_b$.

Nechť je tedy dána norma $\|\cdot\|$ na X . Pro libovolná $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ platí

$$\begin{aligned} \|\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n\| &\leq |\alpha_1| \|x_1\| + \dots + |\alpha_n| \|x_n\| \leq (|\alpha_1| + \dots + |\alpha_n|) \underbrace{\max_{i=1, \dots, n} \|x_i\|}_{\text{ozn. } K_1 > 0} \\ &= K_1 \|\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n\|_c. \end{aligned}$$

Tím jsme získali jeden odhad normy $\|\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n\|$ potřebný pro důkaz ekvivalence norem $\|\cdot\|$ a $\|\cdot\|_c$.

Odhad z druhé strany najdeme nejdříve pro $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in S$, kde

$$S = \{\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \mid \sum_{i=1}^n |\alpha_i| = 1\} \subset \mathbb{R}^n.$$

Ukážeme, že existuje $K_2 > 0$ takové, že

$$\|\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n\| \geq K_2 \quad \forall \alpha \in S.$$

Uvažujme funkci $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

$$F(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \|\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n\|.$$

Funkce F je funkcí n reálných proměnných $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. Je to funkce spojitá neboť je složením dvou spojitých zobrazení: normy a zobrazení

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \rightarrow \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n.$$

Množina S je omezená a uzavřená v \mathbb{R}^n , a tedy podle principu maxima (minima), aplikovaného na funkci F a množinu S , nabývá tato funkce svého minimuma, řekněme K_2 na S . Toto minimum musí být nezáporné. Navíc platí, že je nenulové. To dokážeme sporem. Je-li $K_2 = 0$ existuje $\gamma = (\gamma_1, \dots, \gamma_n) \in S$ tak, že $F(\gamma_1, \dots, \gamma_n) = 0$. To ovšem implikuje

$$\gamma_1 x_1 + \cdots + \gamma_n x_n = 0.$$

Vzhledem k tomu, že x_1, \dots, x_n jsou lineárně nezávislé, máme že $\gamma = 0$, což je ve sporu s $\gamma \in S$.

Pro obecná $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$, ne všechna nulová, položme

$$\beta_i = \frac{\alpha_i}{\sum_{j=1}^n |\alpha_j|}.$$

Pak $\sum_{i=1}^n |\beta_i| = 1$ a podle předchozí části důkazu je

$$\|\beta_1 x_1 + \cdots + \beta_n x_n\| \geq K_2.$$

Tedy

$$K_2 \leq \left\| \frac{\alpha_1}{\sum_{j=1}^n |\alpha_j|} x_1 + \cdots + \frac{\alpha_n}{\sum_{j=1}^n |\alpha_j|} x_n \right\| = \frac{1}{\sum_{j=1}^n |\alpha_j|} \|\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n\|.$$

Odtud dostáváme

$$\|\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n\| \geq K_2 \sum_{j=1}^n |\alpha_j| = K_2 \|\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n\|_c.$$

Je-li $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$, pak tato nerovnost platí také. Máme tak

$$K_2 \|\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n\|_c \leq \|\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n\| \quad \forall \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}.$$

Zkombinujeme-li tento odhad normy $\|\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n\|$ s odhadem, který jsme dostali na začátku důkazu, zjistíme, že pro každá $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ platí

$$K_2 \|\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n\|_c \leq \|\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n\| \leq K_1 \|\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n\|_c.$$

Tedy

$$K_2 \|x\|_c \leq \|x\| \leq K_1 \|x\|_c \quad \forall x \in X$$

a normy $\|\cdot\|_c$ a $\|\cdot\|$ jsou ekvivalentní. Tím je důkaz dokončen. \square

Důsledky: Každý konečně dimenzionální prostor je úplný.

- Každý konečně dimenzionální prostor je úplný. Například předchozí důkaz říká, že každá norma je ekvivalentní normě $\|\cdot\|_c$, která dá úplný prostor (kopii $(\mathbf{R}^n, \|\cdot\|_1)$).
- Všechny konvergence na konečně dimenzionálním prostoru jsou ekvivalentní a rovnají se konvergenci po souřadnicích vzhledem k dané bázi.

Poznámka: Ekvivalence norem na prostoru nekonečné dimenze „zdaleka“ neplatí. Uvažujme např. prostor

$$Y = \{(x_j)_{j=1}^{\infty} \mid x_j \in \mathbb{C}, \text{ nenulových členů je konečně mnoho} \}$$

a na něm normy

$$\begin{aligned}\|(x_j)_{j=1}^{\infty}\|_1 &= \sum_{j=1}^{\infty} |x_j|, \\ \|(x_j)_{j=1}^{\infty}\|_{\infty} &= \sup_n |x_j|, \\ \|(x_j)_{j=1}^{\infty}\|_2 &= \sqrt{\sum_{j=1}^{\infty} |x_j|^2}.\end{aligned}$$

Podívejme se na normy posloupností $x^n = (\underbrace{1, 1, \dots, 1}_n, 0, \dots) \in Y$. Máme

$$\begin{aligned}\|x^n\|_1 &= n, \\ \|x^n\|_{\infty} &= 1, \\ \|x^n\|_2 &= \sqrt{n}.\end{aligned}$$

Kdyby bylo na Y např. $\|\cdot\|_1 \leq K_1\|\cdot\|_2$, pak by pro každé n muselo platit $n \leq K_1\sqrt{n}$, tj. $\sqrt{n} \leq K_1$. To ale pro $K_1 \in \mathbb{R}$ není možné. Podobně dostaneme, že nemohou existovat reálné konstanty K_2 a K_3 takové, že na Y platí $\|\cdot\|_1 \leq K_2\|\cdot\|_\infty$ a $\|\cdot\|_2 \leq K_3\|\cdot\|_\infty$.

Tvrzení: Nechť X je úplný prostor a Y jeho podprostor. Pak Y je úplný právě tehdy, když Y je uzavřený v X (tj. kdykoliv $(y_n)_{n=1}^\infty \subset Y$, $y_n \rightarrow x \in X$, pak $x \in Y$).

Důkaz: " \Rightarrow " Ať Y je úplný. Vezměme posloupnost $(y_n)_{n=1}^\infty \subset Y$ tak, že $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x$, $x \in X$. Protože je posloupnost $(y_n)_{n=1}^\infty$ v X konvergentní, je v X také cauchyovská. Protože leží celá v Y , je cauchyovská i v Y . Tedy z úplnosti Y existuje $y \in Y$ tak, že $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y$. takže musí být $x = y \in Y$. (Posloupnost má nejvýše jednu limitu)

" \Leftarrow " Nechť Y je uzavřený podprostor. Vezměme cauchyovskou posloupnost $(y_n)_{n=1}^\infty \subset Y$. Protože $(y_n)_{n=1}^\infty$ je cauchyovská i v X a X je úplný prostor, existuje $x \in X$ tak, že $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x$. Podprostor Y je ale uzavřený, takže musí být $x \in Y$. Posloupnost $(y_n)_{n=1}^\infty$ je tedy v Y konvergentní. \square

Poznámka Z předchozího důkazu vidíme, že každý podprostor normovaného prostoru, který je úplný je uzavřený. To dá:

Důsledek: Každý konečně dimenzionální podprostor normovaného prostoru je uzavřený..

Příklad: Uvažujme prostor

$$l^\infty = \{(x_i)_{i=1}^\infty \mid \sup_{i=1,2,\dots} |x_i| < \infty\}$$

s normou

$$\|(x_i)_{i=1}^\infty\|_\infty = \sup_{i=1,2,\dots} |x_i|.$$

1) Ukážeme, že $(l^\infty, \|\cdot\|_\infty)$ je úplný prostor. Necht' $(\xi^n)_{n=1}^\infty \subset l^\infty$ je cauchyovská posloupnost. Podle dříve dokázané věty je tato posloupnost omezená. Existuje tedy $K > 0$ takové, že

$$\|\xi^n\|_\infty \leq K \text{ pro každé } n.$$

Pišme $\xi^n = (\xi_i^n)_{i=1}^\infty$. Protože

$$|\xi_i^n - \xi_i^m| \leq \|\xi^n - \xi^m\|_\infty,$$

je pro každé $i \in \mathbb{N}$ posloupnost $(\xi_i^n)_{n=1}^\infty$ (posloupnost i tých souřadnic) cauchyovská, a tedy existuje ξ_i takové, že $\xi_i^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \xi_i$. Položme $\xi = (\xi_i)_{i=1}^\infty$. Jelikož pro každé n, i je $|\xi_i^n| \leq K$, máme $|\xi_i| \leq K$ pro každé i , a tedy $\xi \in l^\infty$.

Ukážeme, že $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi^n = \xi$. Mějme dáno $\varepsilon > 0$. Protože je posloupnost $(\xi^n)_{n=1}^\infty$ cauchyovská, existuje n_0 tak, že

$$\|\xi^n - \xi^m\|_\infty \leq \varepsilon \quad \forall n, m \geq n_0,$$

tj.

$$|\xi_i^n - \xi_i^m| \leq \varepsilon \quad \forall n, m \geq n_0, i = 1, 2, \dots$$

Limitním přechodem pro $m \rightarrow \infty$ dostaneme

$$|\xi_i^n - \xi_i| \leq \varepsilon \quad \forall n \geq n_0, i = 1, 2, \dots,$$

což znamená, že

$$\underbrace{\sup_i |\xi_i^n - \xi_i|}_{\|\xi^n - \xi\|_\infty} < \varepsilon \quad \forall n \geq n_0.$$

Tedy $\xi^n \rightarrow \xi$ v l^∞ .

2) Nyní ukážeme, že podprostor

$$Y = \{(x_i)_{i=1}^\infty \in l^\infty \mid (x_i)_{i=1}^\infty \text{ má konečně mnoho nenulových souřadnic}\}$$

prostoru l^∞ není úplný. Protože podprostor úplného prostoru je úplný, jen když je uzavřený, stačí ukázat, že Y není uzavřený. Uvažujme posloupnost $(x^n)_{n=1}^\infty \subset Y$, kde $x^n = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, 0, 0, \dots)$. Označíme-li

$x = (\frac{1}{i})_{i=1}^\infty \notin Y$, pak $\|x^n - x\|_\infty = \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, tedy $x^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$. To ale znamená, že podprostor Y není uzavřený, a tedy ani úplný.

Příklad: Uvažujme nyní prostor

$$C\langle a, b \rangle = \{f \mid f \text{ je spojitá funkce na omezeném intervalu } \langle a, b \rangle\}$$

(používá se též označení $C(\langle a, b \rangle)$) s normou

$$\|f\|_\infty = \max_{\langle a, b \rangle} |f(x)|.$$

(Uvědomme si, že definice normy je korektní, protože na základě principu maxima pro absolutní hodnotu absolutní hodnoty funkcí z $C\langle a, b \rangle$ nabývají na $\langle a, b \rangle$ své největší hodnoty.) Do okolí funkce f o poloměru $\varepsilon > 0$ patří právě ty funkce g , pro které platí

$$|f(x) - g(x)| < \varepsilon \quad \forall x \in \langle a, b \rangle.$$

Konvergence je tu tedy ve smyslu maximálních odchylek. Této konvergenci se říká stejnoměrná konvergence posloupnosti funkcí.

Ukážeme, že $(C\langle a, b \rangle, \|\cdot\|_\infty)$ je úplný prostor. Vezměme cauchyovskou posloupnost $(f_n)_{n=1}^\infty \subset C\langle a, b \rangle$. Pak pro každé $x \in \langle a, b \rangle$ je $(f_n(x))_{n=1}^\infty$ cauchyovská posloupnost v úplném prostoru reálných čísel. Tedy existuje funkce $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ taková, že $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ pro každé x . Potřebujeme ještě ukázat, že funkce f je spojitá a že $f_n \rightarrow f$ v normě $\|\cdot\|_\infty$. Podívejme se nejdřív na spojitost. Volme $x_0 \in \langle a, b \rangle$ a ukažme spojitost v tomto bodě. Mějme dáno $\varepsilon > 0$. K němu existuje n_0 takové, že pro všechna $n, m \geq n_0$ platí

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq \frac{\varepsilon}{3} \quad \forall x \in \langle a, b \rangle.$$

Limitním přechodem pro $m \rightarrow \infty$ odtud dostáváme

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{3} \quad \forall n \geq n_0 \quad \forall x \in \langle a, b \rangle. \quad (1)$$

Protože je funkce f_{n_0} spojitá v x_0 , existuje $\delta > 0$ takové, že pro každé $x \in U_\delta(x_0) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ platí

$$|f_{n_0}(x) - f_{n_0}(x_0)| \leq \frac{\varepsilon}{3}.$$

Pro $x \in U_\delta(x_0)$ tak máme

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &\leq |f(x) - f_{n_0}(x)| + |f_{n_0}(x) - f_{n_0}(x_0)| + |f_{n_0}(x_0) - f(x_0)| \leq \\ &\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Tím jsme ukázali, že je funkce f v x_0 spojitá. Protože $x_0 \in \langle a, b \rangle$ bylo libovolné, je f spojitá na $\langle a, b \rangle$. Potřebujeme ještě ověřit, že $f_n \rightarrow f$ v normě.

To ale vyplývá okamžitě z (1). Tedy každá cauchyovská posloupnost v $C\langle a, b \rangle$ má v $C\langle a, b \rangle$ limitu, a tím je prostor $C\langle a, b \rangle$ úplný.

Poznámka: Analogicky jako v předcházejícím příkladu lze dokázat úplnost prostoru $(C(M), \|\cdot\|_\infty)$ všech spojitých funkcí na obecné uzavřené omezené množině $M \subset \mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$. Princip maxima totiž platí pro spojitě funkce i na takové množině.

Příklad: Na $C\langle 0, 1 \rangle$ uvažujme normu

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx.$$

V této normě není prostor $C\langle 0, 1 \rangle$ úplný, a tedy normy $\|\cdot\|_\infty$ a $\|\cdot\|_1$ na něm nejsou ekvivalentní. Abychom to dokázali, vezměme např. funkce f_n ($n \geq 2$) spojitě na $\langle 0, 1 \rangle$ takové, že $f_n(x) = 0$ pro $x \in \langle 0, \frac{1}{2} \rangle$, $f_n(x) = 1$ pro $x \in \langle \frac{1}{2} + \frac{1}{n}, 1 \rangle$ a f_n je lineární na $\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \rangle$. (Nakreslete si obrázek.) Protože se pro $n < m$ liší funkce f_n a f_m jen na intervalu $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n})$, a jejich rozdíl je na tomto intervalu menší než 1, máme

$$\|f_n - f_m\|_1 \leq \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2} + \frac{1}{n}} 1 dx = \frac{1}{n}.$$

Pokud tedy k danému $\varepsilon > 0$ zvolíme n_0 tak, že $\frac{1}{n_0} < \varepsilon$, budeme mít

$$\|f_n - f_m\| < \varepsilon \quad \forall n, m \geq n_0.$$

To ale znamená, že je posloupnost $(f_n)_{n=1}^\infty$ v normě $\|\cdot\|_1$ cauchyovská.

Předpokládejme, že v $C\langle 0, 1 \rangle$ existuje limita g posloupnosti $(f_n)_{n=1}^\infty$. Pak

$$\|g - f_n\|_1 = \int_0^{\frac{1}{2}} |g(x)| dx + \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2} + \frac{1}{n}} |g(x) - f_n(x)| dx + \int_{\frac{1}{2} + \frac{1}{n}}^1 |1 - g(x)| dx.$$

Protože podle předpokladu $\|g - f_n\|_1 \rightarrow 0$ a všechny integrály vpravo jsou nezáporné, musí mít tyto integrály (důležité jsou pro nás první a poslední) pro $n \rightarrow \infty$ také nulovou limitu. Z vlastností Lebesgueova integrálu tak dostáváme, že

$$\begin{aligned}g(x) &= 0 \quad \text{na } \langle 0, \tfrac{1}{2} \rangle, \\g(x) &= 1 \quad \text{na } (\tfrac{1}{2}, 1).\end{aligned}$$

To ale znamená, že funkce g není na intervalu $\langle 0, 1 \rangle$ spojitá. Tím jsme došli ke sporu, tedy posloupnost $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ nemá v $C\langle 0, 1 \rangle$ limitu. Prostor $(C\langle 0, 1 \rangle, \|\cdot\|_1)$ tak není úplný.

Definice: Množina S v normovaném prostoru X je **hustá**, jestliže každá neprázdná otevřená množina O v X obsahuje alespoň jeden bod z množiny S .

(Ekvivalentně: Pro každé $x \in X$ existuje posloupnost $(s_n) \subset S$ tak, že $x = \lim_n s_n$.)

Normovaný prostor X se nazývá **separabilní** jestliže má spočetnou hustou podmnožinu

- Každý prostor konečné dimenze je separabilní. (Návod: Množina všech lineárních kombinací prvků báze s racionálními koeficienty je hustá spočetná množina.)

Každý prostor se dá efektivně „zabalit“ do úplného prostoru, Uvedeme si bez důkazu tento princip:

Věta o zúplnění: Pro každý normovaný prostor X existuje Banachův prostor \tilde{X} takový že X je hustým podprostorem prostoru \tilde{X} .

Prostor \tilde{X} se nazývá **zúplněním prostoru X** . Zúplnění je jediné až na lineární bijekci zachovávající normu.

Příklad: Prostor $L^1(\langle a, b \rangle)$ lebesgueovskey integrovatelných funkcí na intervalu $\langle a, b \rangle$ je zúplněním prostoru spojitých funkcí $C(\langle a, b \rangle)$ s integrální normou danou Riemannovým integrálem

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(x)| dx$$

Tedy Riemann \rightarrow Lebesgue odpovídá zúplnění a přechodu spojité funkce \rightarrow lebesgueovscky integrovatelné funkce.

Jednou z aplikací konceptu úplnosti jsou věty o pevném bodě.

Definice: Ať K je podmnožina normovaného prostoru X . Ať $T : K \rightarrow X$ je zobrazení. Pak se $x \in K$ nazývá **pevným bodem** zobrazení T jestliže platí

$$T(x) = x.$$

Značení: pro zobrazení $T : X \rightarrow Y$ označme n -násobnou kompozici

$$T^n = \overbrace{T \circ T \circ \dots \circ T}^{n\text{krát}}$$

Pozorování: Ať $T : X \rightarrow X$ je spojité zobrazení na normovaném prostoru X . Jestliže je pro dané $x_0 \in X$ posloupnost $(T^n(x_0))_{n=0}^\infty$ konvergentní, pak konverguje k pevnému bodu zobrazení T .

Odvození: Označme $x_n = T^n(x_0)$ a její limitu x . Pak platí, že

$$x_{n+1} = T(x_n)$$

a limitním předchodem máme díky spojitosti T

$$x = T(x).$$

Definice: Ať K je podmnožina normovaného prostoru X . Zobrazení $T : K \rightarrow K$ se nazývá **kontraktivní**, jestliže existuje $0 \leq \alpha < 1$ tak, že

$$\|T(x) - T(y)\| \leq \alpha \|x - y\| \quad \forall x, y \in K.$$

Banachova věta o pevném bodě: Nechť K je uzavřená množina v Banachově prostoru X . Ať $T : K \rightarrow K$ je kontraktivní zobrazení. Pak existuje právě jeden pevný bod zobrazení T .

Důkaz: Zvolme $x_0 \in K$ a ukážeme, že posloupnost daná $x_n = T^n(x_0)$ je cauchyovská.

Předpokádejme, že $0 \leq \alpha < 1$ je koeficient kontrakce zobrazení T . Platí odhady

$$\|x_2 - x_1\| = \|T(x_1) - T(x_0)\| \leq \alpha \|x_1 - x_0\|$$

$$\|x_3 - x_2\| = \|T(x_2) - T(x_1)\| \leq \alpha \|x_2 - x_1\| \leq \alpha^2 \|x_1 - x_0\|.$$

Opakováním dostaneme

$$\|x_{k+1} - x_k\| \leq \alpha^k \|x_1 - x_0\|.$$

Ať je $m \geq n$. Pak máme (využíváme součet geometrické řady)

$$\begin{aligned} \|x_m - x_n\| &\leq \|x_m - x_{m-1}\| + \|x_{m-1} - x_{m-2}\| + \cdots + \|x_{n+1} - x_n\| \leq \\ &\leq (\alpha^{m-1} + \alpha^{m-2} + \cdots + \alpha^n) \|x_1 - x_0\| = \alpha^n \frac{1 - \alpha^{m-n}}{1 - \alpha} \|x_1 - x_0\|. \end{aligned}$$

Vzhledem k tomu, že $|\alpha| < 1$, máme že odhad napravo konverguje k nule pro $n, m \rightarrow \infty$. Tím jsme dokázali, že je posloupnost cauchyovská v X .

Dle úplnosti má tedy limitu $x \in X$. Tato limita musí ležet v K neboť K je uzavřená. Dle předchozí úvahy je x pevným bodem zobrazení T . Tím je dokázána existence pevného bodu. Každé kontraktivní zobrazení musí mít nejvýše jeden pevný bod, což dokazuje jednoznačnost. \square

Důkaz dává současně návod na numerický výpočet pevného bodu. Startuje s x_0 a děláme iterace $T(x_0), T(T(x_0)), T(T(T(x_0))), \dots$

Na této větě je založen důkaz existence řešení parciálních diferenciálních rovnic, metody prosté iterace řešení nelineárních rovnic a jejich soustav, atd.

Ilustrační příklad: Řešíme rovnici

$$F(x) = 0$$

(1) Snažíme se převést ji na úlohu o pevném bodě, např. prepisem rovnice

$$f(x) = x - \lambda F(x) = x.$$

kde $\lambda \neq 0$.

(2) snažíme se volit λ tak, aby $f(x)$ byla kontrakce na dané množině.

(3) Aplikujeme iterace

$$x_0, f(x_0), f(f(x_0)) \dots$$