

Lineární závislost a nezávislost

Odpřednesenou látku naleznete v kapitole 3.1 skript
Abstraktní a konkrétní lineární algebra.

Minulé přednášky

- 1 Lineární kombinace.
- 2 Definice lineárního obalu.
- 3 Definice lineárního podprostoru.

Dnešní přednáška

- 1 Lineární závislost/nezávislost seznamu a množiny vektorů v lineárním prostoru.

Připomenutí

1 Pro



v \mathbb{R}^3 je $\text{span}(\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\})$ rovina procházející počátkem se směrem $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)$.

2 Pro



v \mathbb{R}^3 , lineární obal $\text{span}(\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\})$ rovina není.

V množině $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$ je (například) vektor \mathbf{a}_2 „zbytečný vzhledem k tvorbě lineárních kombinací“.^a

Platí totiž $\text{span}(\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}) = \text{span}(\{\mathbf{a}_1\})$.

^aZa chvíli budeme říkat, že množina $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$ je lineárně závislá.

Definice

Lineární kombinace $a_1 \cdot \vec{x}_1 + \dots + a_n \cdot \vec{x}_n$ je **triviální**, pokud $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$.

V opačném případě je lineární kombinace $a_1 \cdot \vec{x}_1 + \dots + a_n \cdot \vec{x}_n$ **netriviální**.

Poznámky

- 1 Triviální lineární kombinace je **vždy** rovna nulovému vektoru: rovnost $0 \cdot \vec{x}_1 + \dots + 0 \cdot \vec{x}_n = \vec{0}$ platí, protože $0 \cdot \vec{x} = \vec{0}$, pro jakýkoli vektor \vec{x} (dokázáno minule).
- 2 I netriviální lineární kombinace může být rovna nulovému vektoru: například $\vec{x} - \vec{x} = \vec{0}$, pro jakýkoli vektor \vec{x} .
- 3 Lineární kombinaci, která dává nulový vektor, také říkáme **nulová kombinace**.^a

^aPozor: triviální kombinace je **vždy** nulová. Nulová kombinace **nemusí** být triviální.

Definice (lineární nezávislost seznamu vektorů)

Řekneme, že seznam S vektorů je **lineárně nezávislý**, pokud platí jedna z podmínek:

- 1 Seznam S je prázdný.
- 2 Seznam S je tvaru $(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n)$ a platí: kdykoli $a_1 \cdot \vec{x}_1 + \dots + a_n \cdot \vec{x}_n = \vec{0}$, pak $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$.

Řekneme, že seznam S je **lineárně závislý**, pokud není lineárně nezávislý.

Příklady

- 1 Prázdný seznam $()$ je **vždy** lineárně nezávislý.
- 2 Seznam $(\vec{0})$ je **vždy** lineárně závislý.
- 3 Seznam, ve kterém se opakuje vektor, je **vždy** lineárně závislý.

Příklad

Nulová lineární kombinace $x_1 \cdot \mathbf{a}_1 + \dots + x_s \cdot \mathbf{a}_s = \mathbf{0}$ v \mathbb{F}^r , kde

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{r1} \end{pmatrix}, \dots, \mathbf{a}_s = \begin{pmatrix} a_{1s} \\ a_{2s} \\ \vdots \\ a_{rs} \end{pmatrix}$$

kóduje soustavu r lineárních rovnic

$$\begin{aligned} x_1 a_{11} + x_2 a_{12} + \dots + x_s a_{1s} &= 0 \\ x_1 a_{21} + x_2 a_{22} + \dots + x_s a_{2s} &= 0 \\ &\vdots \\ x_1 a_{r1} + x_2 a_{r2} + \dots + x_s a_{rs} &= 0 \end{aligned}$$

o s neznámých nad \mathbb{F} .

Seznam $(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_s)$ je lineárně nezávislý právě tehdy, když tato soustava má pouze **triviální** řešení $x_1 = x_2 = \dots = x_s = 0$.

Definice (lineární nezávislost množiny vektorů)

At' M je množina vektorů v lineárním prostoru L . Řekneme, že M je **lineárně nezávislá**, pokud platí jedna z následujících podmínek:

- 1 Množina M je prázdná.
- 2 $M = \{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n\}$ je neprázdná konečná množina a navíc platí: kdykoli $a_1 \cdot \vec{x}_1 + \dots + a_n \cdot \vec{x}_n = \vec{0}$, pak $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$.
- 3 M je nekonečná množina a každá její konečná podmnožina je lineárně nezávislá.

Řekneme, že množina M je **lineárně závislá**, pokud není lineárně nezávislá.

Praktický test lineární nezávislosti neprázdné množiny M

Musí platit následující implikace:

At' $a_1 \cdot \vec{x}_1 + \dots + a_n \cdot \vec{x}_n = \vec{0}$, kde $n > 0$ je přirozené číslo, vektory $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n$ jsou z M a skaláry a_1, \dots, a_n jsou z \mathbb{F} . Potom $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$.

Příklady

- ① $\{\vec{0}\}$ je lineárně závislá množina v jakémkoli lineárním prostoru L .

Obecněji: ať $\vec{0} \in M$, potom M je lineárně závislá množina.

- ② Množina $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ je lineárně nezávislá množina v \mathbb{R}^3 .

Obecněji: definujte pro $i = 1, \dots, n$, vektor $\mathbf{e}_i \in \mathbb{R}^n$ jako n -tici mající na i -té pozici 1 a všude jinde 0. Potom $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ je lineárně nezávislá množina v \mathbb{R}^n .

- ③ Nekonečná množina $\{1, x, x^2, x^3, \dots\}$ je lineárně nezávislá množina v prostoru polynomů $\mathbb{R}[x]$.

Příklady (pokrač.)

- 4 Množina $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -7 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \\ -9 \end{pmatrix} \right\}$ je lineárně závislá množina v \mathbb{R}^3 .

Důvod:

$$2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -7 \\ 3 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \\ -9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Tvrzení

Ať M je lineárně nezávislá množina vektorů v lineárním prostoru L .
Jakmile $N \subseteq M$, je i N lineárně nezávislá množina vektorů.

Důkaz.

Přednáška. ■

Slogan

Ubereme-li z lineárně nezávislé množiny vektorů nějaké vektory, je výsledná množina opět lineárně nezávislá.

Tvrzení

At' M je lineárně závislá množina vektorů v lineárním prostoru L .
Jakmile N je množina vektorů z L a platí $M \subseteq N$, je i N lineárně závislá množina vektorů.

Důkaz.

Přednáška. 

Slogan

Přidáme-li do lineárně závislé množiny vektorů nějaké vektory, je výsledná množina opět lineárně závislá.

Věta (charakterisace lineárně nezávislých množin)


Pro množinu M vektorů z lineárního prostoru L jsou následující podmínky ekvivalentní:

- 1 Množina M je lineárně nezávislá.
- 2 Pro každý vektor $\vec{x} \notin \text{span}(M)$ je množina $M \cup \{\vec{x}\}$ lineárně nezávislá.

Důkaz.

Přednáška. ■

Ilustrační obrázek



Věta (charakterisace lineárně závislých množin)

Pro množinu M vektorů z lineárního prostoru L jsou následující podmínky ekvivalentní:

- 1 Množina M je lineárně závislá.
- 2 Existuje $\vec{v} \in M$ tak, že $\text{span}(M \setminus \{\vec{v}\}) = \text{span}(M)$.

Důkaz.

Přednáška. ■

Ilustrační obrázek

