

## Vzájemná poloha afinních podprostorů

Odpřednesenou látku naleznete v kapitolách 7.1, 7.2 a 7.3 skript *Abstraktní a konkrétní lineární algebra*.

## Co již víme? (přednášky z teorie soustav lineárních rovnic)

- 1 Pro  $\mathbf{A} : \mathbb{F}^s \rightarrow \mathbb{F}^r$  a  $\mathbf{b}$  z  $\mathbb{F}^r$  je obecné řešení soustavy  $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$  tvaru  $\mathbf{p} + \ker(\mathbf{A})$ .  
Množina  $\mathbf{p} + \ker(\mathbf{A})$  je  **$d$ -dimensionální afinní podprostor** (kde  $d = \text{def}(\mathbf{A})$ ) v prostoru  $\mathbb{F}^s$ . Tato plocha **prochází** bodem  $\mathbf{p}$ .
- 2 Jakoukoli podmnožinu prostoru  $\mathbb{F}^s$  tvaru  $\mathbf{p} + W$ , kde  $W$  je **lineární podprostor** prostoru  $\mathbb{F}^s$  a  $\mathbf{p}$  je bod  $\mathbb{F}^s$ , lze považovat za množinu řešení nějaké vhodné soustavy rovnic  $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ .

## Dnešní přednáška

- 1 Zaměříme<sup>a</sup> se na **afinní podprostory** prostoru  $\mathbb{R}^n$  nad  $\mathbb{R}$ .
- 2 Budeme studovat **vzájemnou polohu** afinních podprostorů prostoru  $\mathbb{R}^n$ .
- 3 Porovnáme dva popisy afinních podprostorů: **parametrický zápis** a **rovnicový zápis**.

---


<sup>a</sup>Celá dnešní přednáška projde v prostorech typu  $\mathbb{F}^n$  nad  $\mathbb{F}$ , kde  $\mathbb{F}$  je těleso.

## Definice

Množině  $\mathbf{p} + W = \{\mathbf{p} + \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in W\}$ , kde  $W$  je lineární podprostor prostoru  $\mathbb{R}^n$  a  $\mathbf{p}$  je bod z  $\mathbb{R}^n$ , říkáme **afinní podprostor** prostoru  $\mathbb{R}^n$ .

**Dimense**<sup>a</sup> afinního prostoru  $\mathbf{p} + W$  je číslo  $\dim(W)$ . Lineárnímu prostoru  $W$  říkáme **směr** afinního podprostoru  $\mathbf{p} + W$ .

<sup>a</sup>Afinním podprostorům v  $\mathbb{R}^n$  dimense 0 budeme říkat **body**, afinním podprostorům v  $\mathbb{R}^n$  dimense 1 budeme říkat **přímky**, afinním podprostorům v  $\mathbb{R}^n$  dimense 2 budeme říkat **roviny**.



## Příklady afinních podprostorů prostoru $\mathbb{R}^4$

Množiny

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 10 \\ 9 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}\right), \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ -3 \\ 9 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}\right) \\
\begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$$

jsou afinní podprostory prostoru  $\mathbb{R}^4$ . Jejich dimenze jsou postupně 0, 1, 2 a 3. A jejich směry jsou:

$$\left\{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}, \quad \text{span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}\right), \quad \text{span}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}\right), \quad \text{span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$$

## Příklad (vzájemná poloha přímek v $\mathbb{R}^3$ , intuitivní výpočet)

- 1 Přímky  $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$  a  $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$  jsou **rovnoběžné**.

Obě přímky mají **stejný směr**, je jím vektor  $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

- 2 Přímky  $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$  a  $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$  jsou **různoběžné**.

To zjistíme následujícím způsobem: přímky **nejsou** rovnoběžné:

rovnost  $\text{span}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \text{span}\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$  **neplatí**. Navíc mají obě

přímky **společný bod**, je jím vektor  $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ .

## Příklad (vzájemná poloha přímek v $\mathbb{R}^3$ , pokrač.)

- 3 Přímky  $\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$  a  $\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$  jsou **mimoběžné**.

To zjistíme následujícím způsobem: přímky **nejsou** rovnoběžné:

rovnost  $\text{span}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \text{span}\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$  **neplatí**. Navíc obě přímky

**nemají společný bod**: neexistují reálná čísla  $s, t$  tak, že

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

O tom se lze snadno přesvědčit řešením příslušné soustavy rovnic.

## Jak postupovat v $\mathbb{R}^n$ ?

Potřebujeme **dobré definice** a **dobrá kritéria** vzájemné polohy!

## Definice (vzájemná poloha afinních podprostorů)


Ať  $\pi = \mathbf{p} + W$  a  $\pi' = \mathbf{p}' + W'$  jsou dva afinní podprostory prostoru  $\mathbb{R}^n$ . Řekneme, že

- 1  $\pi$  a  $\pi'$  jsou **rovnoběžné**, pokud platí  $W \subseteq W'$  nebo  $W' \subseteq W$ .
- 2  $\pi$  a  $\pi'$  jsou **různoběžné**, pokud nejsou rovnoběžné a mají alespoň jeden společný bod.
- 3  $\pi$  a  $\pi'$  jsou **mimoběžné**, pokud nejsou rovnoběžné a nemají žádný společný bod.

Dimensi lineárního podprostoru  $W \cap W'$  budeme říkat **stupeň rovnoběžnosti** afinních podprostorů  $\pi$  a  $\pi'$ .

### Poznámka

Pro dva afinní podprostory  $\pi$  a  $\pi'$  prostoru  $\mathbb{R}^n$  platí:



## Tvrzení (charakterisace rovnoběžných disjunktních afinních podprostorů)

Ať  $\pi = \mathbf{p} + W$  a  $\pi' = \mathbf{p}' + W'$  jsou dva afinní podprostory prostoru  $\mathbb{R}^n$ . Ať  $W' \subseteq W$ . Potom jsou následující podmínky ekvivalentní:

- 1 Afinní podprostory  $\pi$  a  $\pi'$  jsou **disjunktní**.
- 2 Pro jakýkoli vektor  $\mathbf{x}$  v  $\pi$  a jakýkoli vektor  $\mathbf{x}'$  v  $\pi'$  vektor  $\mathbf{x} - \mathbf{x}'$  neleží ve  $W$ .
- 3 Vektor  $\mathbf{p} - \mathbf{p}'$  neleží ve  $W$ .
- 4 Existuje vektor  $\mathbf{x}$  v  $\pi$  a existuje vektor  $\mathbf{x}'$  v  $\pi'$  tak, že vektor  $\mathbf{x} - \mathbf{x}'$  neleží ve  $W$ .

### Důkaz.

Přednáška. ■



## Tvrzení (charakterisace různoběžných afinních podprostorů)

Ať  $\pi = \mathbf{p} + W$  a  $\pi' = \mathbf{p}' + W'$  jsou dva afinní podprostory prostoru  $\mathbb{R}^n$ , které nejsou rovnoběžné. Potom jsou následující podmínky ekvivalentní:

- 1 Afinní podprostory  $\pi$  a  $\pi'$  jsou **různoběžné**.
- 2 Pro jakýkoli vektor  $\mathbf{x}$  v  $\pi$  a jakýkoli vektor  $\mathbf{x}'$  v  $\pi'$  vektor  $\mathbf{x} - \mathbf{x}'$  leží ve  $W \vee W'$ .
- 3 Vektor  $\mathbf{p} - \mathbf{p}'$  leží ve  $W \vee W'$ .
- 4 Existuje vektor  $\mathbf{x}$  v  $\pi$  a existuje vektor  $\mathbf{x}'$  v  $\pi'$  tak, že vektor  $\mathbf{x} - \mathbf{x}'$  leží ve  $W \vee W'$ .

### Důkaz.

Přednáška. ■

## Tvrzení (charakterisace mimoběžných afinních podprostorů)

Ať  $\pi = \mathbf{p} + W$  a  $\pi' = \mathbf{p}' + W'$  jsou dva afinní podprostory prostoru  $\mathbb{R}^n$ , které nejsou rovnoběžné. Potom jsou následující podmínky ekvivalentní:

- 1 Afinní podprostory  $\pi$  a  $\pi'$  jsou **mimoběžné**.
- 2 Vektor  $\mathbf{p} - \mathbf{p}'$  neleží ve  $W \vee W'$ .

## Důkaz.

Přednáška. ■

## Příklad (dva různé zápisy jedné přímky)


Dva zápisy téže přímky v  $\mathbb{R}^2$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot t, \quad t \in \mathbb{R}}_{\text{parametrický zápis}}$$

$$\underbrace{-x + 3y = 5}_{\text{rovnicový zápis}}$$

Oba typy zápisu jsme již potkali při úvahách o řešitelnosti soustav lineárních rovnic a zapisovali jsme je jako

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \quad (-1 \ 3 \mid 5)$$



Získáváme informace o **směrovém vektoru** a **normálovém vektoru**.

## Tvrzení (Existence parametrického a rovnicového zápisu)


Ať  $\pi = \mathbf{p} + W$  je  $d$ -dimensionální afinní podprostor prostoru  $\mathbb{R}^n$ .  
 Potom existují dvě matice  $\mathbf{S} : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^n$  a  $\mathbf{N}^T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n-d}$  tak, že platí:

- 1 Platí  $\text{im}(\mathbf{S}) = W = \ker(\mathbf{N}^T)$ ,  $\text{rank}(\mathbf{N})^T = n - d$  a  $\text{rank}(\mathbf{S}) = d$ .
- 2 Vektor  $\mathbf{x}$  leží v  $\pi$  právě tehdy, když platí rovnost  $\mathbf{x} = \mathbf{p} + \mathbf{S} \cdot \mathbf{t}$  pro nějaké  $\mathbf{t}$ . Tomuto zápisu říkáme **parametrický zápis** afinního podprostoru  $\pi$ .
- 3 Vektor  $\mathbf{x}$  leží v  $\pi$  právě tehdy, když platí rovnost  $\mathbf{N}^T \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{p}) = \mathbf{o}$ . Tomuto zápisu říkáme **rovnicový zápis** afinního podprostoru  $\pi$ .

## Důkaz.

Přednáška.

## Poznámky



**Pozor:** musí platit rovnosti  $\text{rank}(\mathbf{S}) = d$  a  $\text{rank}(\mathbf{N}^T) = n - d$ .

2 **Proč** je rovnicový zápis ve tvaru  $\mathbf{N}^T \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{p}) = \mathbf{o}$ ?

1 Bod  $\mathbf{p}$  vyhovuje rovnici  $\mathbf{N}^T \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{p}) = \mathbf{o}$ . Ihned vidíme, že afinní podprostor **prochází** bodem  $\mathbf{p}$ .

2 Pokud označíme jako  $\mathbf{N} = (\mathbf{n}_1, \dots, \mathbf{n}_{n-d})$ , pak rovnost  $\mathbf{N}^T \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{p}) = \mathbf{o}$  je ekvivalentní rovnostem

$$\langle \mathbf{n}_1 \mid \mathbf{x} - \mathbf{p} \rangle = 0, \quad \langle \mathbf{n}_2 \mid \mathbf{x} - \mathbf{p} \rangle = 0, \quad \dots, \quad \langle \mathbf{n}_{n-d} \mid \mathbf{x} - \mathbf{p} \rangle = 0$$

To znamená, že sloupce matice  $\mathbf{N}$  si lze přestavit jako **seznam lineárně nezávislých „normál“** příslušného afinního podprostoru.

## Tvrzení (charakterisace rovnoběžných disjunktních afinních podprostorů)

At'  $\pi = \mathbf{p} + W$  a  $\pi' = \mathbf{p}' + W'$  jsou dva afinní podprostory prostoru  $\mathbb{R}^n$ , zadány parametricky jako  $\mathbf{x} = \mathbf{p} + \mathbf{S} \cdot \mathbf{t}$  a  $\mathbf{x}' = \mathbf{p}' + \mathbf{S}' \cdot \mathbf{t}'$ .

① Následující podmínky jsou ekvivalentní:

① Platí  $W' \subseteq W$ .

② Platí  $\text{span}(\mathbf{s}'_1, \dots, \mathbf{s}'_{d'}) \subseteq \text{span}(\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_d)$ , kde  $\mathbf{S}' = (\mathbf{s}'_1, \dots, \mathbf{s}'_{d'})$  a  $\mathbf{S} = (\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_d)$ .

③ Simultánní soustava  $(\mathbf{S} \mid \mathbf{S}')$  má řešení.

② At'  $W' \subseteq W$ . Následující podmínky ekvivalentní:

① Afinní podprostory  $\pi$  a  $\pi'$  jsou **disjunktní**.

② Pro jakýkoli vektor  $\mathbf{x}$  v  $\pi$  a jakýkoli vektor  $\mathbf{x}'$  v  $\pi'$  soustava  $(\mathbf{S} \mid \mathbf{x} - \mathbf{x}')$  nemá řešení.

③ **Soustava  $(\mathbf{S} \mid \mathbf{p} - \mathbf{p}')$  nemá řešení.**

④ Existuje vektor  $\mathbf{x}$  v  $\pi$  a existuje vektor  $\mathbf{x}'$  v  $\pi'$  tak, že soustava  $(\mathbf{S} \mid \mathbf{x} - \mathbf{x}')$  nemá řešení.

**Důkaz.**

Přednáška.

## Tvrzení (charakterisace různoběžných afinních podprostorů)

At'  $\pi = \mathbf{p} + W$  a  $\pi' = \mathbf{p}' + W'$  jsou dva afinní podprostory prostoru  $\mathbb{R}^n$ , které nejsou rovnoběžné. At'  $\pi$  a  $\pi'$  zadány parametricky jako  $\mathbf{x} = \mathbf{p} + \mathbf{S} \cdot \mathbf{t}$  a  $\mathbf{x}' = \mathbf{p}' + \mathbf{S}' \cdot \mathbf{t}'$ . Potom jsou následující podmínky ekvivalentní:

- 1 Afinní podprostory  $\pi$  a  $\pi'$  jsou **různoběžné**.
- 2 Pro jakýkoli vektor  $\mathbf{x}$  v  $\pi$  a jakýkoli vektor  $\mathbf{x}'$  v  $\pi'$  soustava  $(\mathbf{S}', \mathbf{S} \mid \mathbf{x} - \mathbf{x}')$  má řešení.
- 3 **Soustava  $(\mathbf{S}', \mathbf{S} \mid \mathbf{p} - \mathbf{p}')$  má řešení.**
- 4 Existuje vektor  $\mathbf{x}$  v  $\pi$  a existuje vektor  $\mathbf{x}'$  v  $\pi'$  tak, že soustava  $(\mathbf{S}', \mathbf{S} \mid \mathbf{x} - \mathbf{x}')$  má řešení.

## Důkaz.

Přednáška.

## Tvrzení (charakterisace mimoběžných afinních podprostorů)

At'  $\pi = \mathbf{p} + W$  a  $\pi' = \mathbf{p}' + W'$  jsou dva afinní podprostory prostoru  $\mathbb{R}^n$ , které nejsou rovnoběžné. At'  $\pi$  a  $\pi'$  zadány parametricky jako  $\mathbf{x} = \mathbf{p} + \mathbf{S} \cdot \mathbf{t}$  a  $\mathbf{x}' = \mathbf{p}' + \mathbf{S}' \cdot \mathbf{t}'$ . Potom jsou následující podmínky ekvivalentní:

- 1 Afinní podprostory  $\pi$  a  $\pi'$  jsou **mimoběžné**.
- 2 Soustava  $(\mathbf{S}', \mathbf{S} \mid \mathbf{p} - \mathbf{p}')$  nemá řešení.


## Důkaz.

Přednáška. ■



## Důležitá poznámka

Při rozhodování o vzájemné poloze afinních podprostorů  $\pi$  a  $\pi'$  je velmi rozumné postupovat podle obrázku



Povšimněte si, že tak tomu bude ve všech následujících příkladech.

## Příklad 1 (vzájemná poloha dvou rovin v $\mathbb{R}^5$ )

V  $\mathbb{R}^5$  rozhodněte o vzájemné poloze afinních podprostorů

$$\pi = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \text{span}\left( \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \quad \pi' = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \text{span}\left( \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

❶ Rovnoběžnost: ani jedna ze simultánních soustav

$$\left( \begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \left( \begin{array}{cc|cc} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

nemá řešení. Takže  $\pi$  a  $\pi'$  nejsou rovnoběžné.

## Příklad 1 (vzájemná poloha dvou rovin v $\mathbb{R}^5$ , pokrač.)

- ① Různoběžnost: stačí zjistit, zda soustava<sup>a</sup>

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

má řešení. Protože řešení neexistuje, jsou  $\pi$  a  $\pi'$  **mimoběžné**.

**Závěr:** roviny  $\pi$  a  $\pi'$  jsou **mimoběžné**.

---

<sup>a</sup>Pravá strana je  $\mathbf{p} - \mathbf{p}'$ .

## Příklad 2 (vzájemná poloha přímek v $\mathbb{R}^3$ )

Rozhodněte o vzájemné poloze přímek  $\pi = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$  a

$$\pi' = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right).$$

- ① Rovnoběžnost: obě simultánní soustavy

$$\left( \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{array} \right) \quad \left( \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{array} \right)$$

mají zjevně řešení;  $\pi$  a  $\pi'$  jsou **rovnoběžné**.

- ② Jsou  $\pi$  a  $\pi'$  disjunktní? Stačí zjistit, zda soustava rovnic

$$\left( \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ 2 & -2 \\ 1 & 0 \end{array} \right)$$

má řešení. Pravá strana je  $\mathbf{p} - \mathbf{p}'$ .

## Příklad 2 (vzájemná poloha přímek v $\mathbb{R}^3$ , pokrač.)

Soustava

$$\left( \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ 2 & -2 \\ 1 & 0 \end{array} \right)$$

evidentně řešení nemá; přímky  $\pi$  a  $\pi'$  jsou **disjunktní**.

**Závěr:** přímky  $\pi$  a  $\pi'$  jsou **rovnoběžné a disjunktní**.

## Příklad 3 (vzájemná poloha přímek v $\mathbb{R}^3$ )

Rozhodněte o vzájemné poloze přímek  $\pi = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$  a

$$\pi' = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right).$$

### Příklad 3 (vzájemná poloha přímek v $\mathbb{R}^3$ , pokrač.)

- ① Rovnoběžnost: žádná ze simultánních soustav

$$\left( \begin{array}{c|c} 0 & 3 \\ 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{array} \right) \quad \left( \begin{array}{c|c} 3 & 0 \\ 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{array} \right)$$

řešení nemá; přímky  $\pi$  a  $\pi'$  nejsou rovnoběžné.

- ② Různoběžnost: protože soustava<sup>a</sup>

$$\left( \begin{array}{cc|c} 0 & 3 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

má řešení, jsou přímky  $\pi$  a  $\pi'$  různoběžné.

**Závěr:** přímky  $\pi$  a  $\pi'$  jsou různoběžné.

---

<sup>a</sup>Pravá strana je  $\mathbf{p} - \mathbf{p}'$ .

## Příklad 4 (vzájemná poloha přímek v $\mathbb{R}^3$ )

Rozhodněte o vzájemné poloze přímek  $\pi = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$  a

$$\pi' = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right).$$

- ① Rovnoběžnost: žádná ze simultánních soustav

$$\left( \begin{array}{c|c} 0 & 3 \\ 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{array} \right) \quad \left( \begin{array}{c|c} 3 & 0 \\ 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{array} \right)$$

řešení nemá; přímky  $\pi$  a  $\pi'$  nejsou rovnoběžné.

## Příklad 4 (vzájemná poloha přímek v $\mathbb{R}^3$ , pokrač.)

② Různoběžnost: soustava<sup>a</sup>

$$\left( \begin{array}{cc|c} 0 & 3 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

nemá řešení, přímky  $\pi$  a  $\pi'$  jsou **mimoběžné**.

**Závěr:** přímky  $\pi$  a  $\pi'$  jsou **mimoběžné**.

---

<sup>a</sup>Pravá strana je  $\mathbf{p} - \mathbf{p}'$ .



## Příklad 5 (vzájemná poloha dvou rovin v $\mathbb{R}^4$ )

V  $\mathbb{R}^4$  rozhodněte o vzájemné poloze afinních podprostorů

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \quad \pi' = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$$

- 1 Rovnoběžnost: řešíme simultánní soustavy

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right) \quad \left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

Roviny budou rovnoběžné, pokud alespoň jedna simultánní soustava má řešení.

## Příklad 5 (vzájemná poloha dvou rovin v $\mathbb{R}^4$ , pokrač.)

❶ Pomocí Gaussovy eliminace dostáváme

$$\left( \begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} R_1 \\ R_2 \\ R_3 - 3R_1 \\ R_4 - R_1 \end{array}$$

Simultánní soustava

$$\left( \begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

tedy řešení nemá.

## Příklad 5 (vzájemná poloha dvou rovin v $\mathbb{R}^4$ , pokrač.)

❶ Pomocí Gaussovy eliminace dostáváme

$$\left( \begin{array}{cc|cc} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \end{array} \right) \begin{array}{l} R_4 \\ R_2 \\ R_1 \\ R_3 \end{array} \sim \left( \begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \begin{array}{l} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \\ R_4 - 3R_1 \end{array}$$

Ani simultánní soustava

$$\left( \begin{array}{cc|cc} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

tedy řešení nemá.

Ukázali jsme, že  $\pi$  a  $\pi'$  nejsou rovnoběžné.

## Příklad 5 (vzájemná poloha dvou rovin v $\mathbb{R}^4$ , pokrač.)

- ② Různoběžnost: stačí zjistit, zda soustava<sup>a</sup>

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & -1 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

má řešení.

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & -1 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} R_1 \\ R_2 \\ R_3 - 3R_1 \\ R_4 - R_1 \end{array} \sim \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \begin{array}{l} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \\ 3R_4 - R_3 \end{array}$$

Řešení existuje,  $\pi$  a  $\pi'$  jsou různoběžné.

**Závěr:** roviny  $\pi$  a  $\pi'$  jsou různoběžné.

---

<sup>a</sup>Pravá strana je  $\mathbf{p} - \mathbf{p}'$ .

## Závěrečná poznámka

Tvrzení o rovnoběžnosti, různoběžnosti, mimoběžnosti, existenci parametrického zápisu a rovnicového zápisu lze **stejným způsobem** dokázat v prostoru  $\mathbb{F}^n$ , kde  $\mathbb{F}$  je **jakékoli těleso**.<sup>a</sup>

---

<sup>a</sup>To znamená: **rozumíme** například pojmům rovnoběžnosti, různoběžnosti, mimoběžnosti afinních podprostorů prostoru  $\mathbb{C}^6$  nad  $\mathbb{C}$ .

## Co příště a přespříště?

- 1 Zavedeme **vektorový součin** v  $\mathbb{R}^n$ , kde  $n \geq 2$ .
- 2 Naučíme se počítat **vzájemné vzdálenosti** afinních podprostorů prostoru  $\mathbb{R}^n$ .

Tyto výsledky budou podstatně využívat existenci **standardního skalárního součinu** v  $\mathbb{R}^n$ .